

POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I DRAGI GLEDAOCI DOBRO DOŠLI U „ZELENU PROGNOZU“

DANAS VAS INFORMIŠEMO O OBIČNOJ KRUŠKINOJ BUVI, NAJZNAČAJNIJOJ ŠTETOČINI U PROIZVODNJI KRUŠAKA NA NAŠEM PODRUČJU

---

### FAZE RAZVOJA KRUŠAKA

NA PODRUČJU VOJVODINE U TOKU JE BERBA RANIH SORATA KRUŠAKA, DOK SE SREDNJE I KASNE KASNE SORTE NALAZE U FAZI OD PLODOVI OKO 70% KRAJNJE VELIČINE DO FAZE POČETAK ZRENJA-POJAVLJUJE SE BOJA KARAKTERISTIČNA ZA KULTIVAR.

### OBIČNA KRUŠKINA BUVA (*Cacopsylla pyri*)

OBIČNA KRUŠKINA BUVA JE NAJZNAČAJNIJA ŠTETOČINA KRUŠKE U INTENZIVNOJ PROIZVODNJI.

ŠTETNI SU SVIH PET LARVENIH STADIJUMA, KOJI SE ISHRANJUJU SISAJUĆI SOKOVE BILJAKA. VIŠAK HRANE IZBACUJU U VIDU MEDNE ROSE, NA KOJU SE NASELJAVA GLJIVA ČAĐAVICA. NAPADNUTI BILJNI DELOVI DOBIJAJU CRNU BOJU, A PLODOVI GUBE TRŽIŠNU VREDNOST.

TRENTNO SE U KRUŠICIMA REGISTRUJE PILJENJE LARVI III LETNJE GENERACIJE OBIČNE KRUŠKINE BUVE.



SLIKA 1. LARVE  
OBIČNE KRUŠKINE  
BUVE



SLIKA 2. LIST KRUŠKE SA LARVAMA U MEDNOJ ROSI



SLIKA 3. PLOD KRUŠKE SA LARVAMA U MEDNOJ ROSI



SLIKA 4. ŠTETE NA MLADARIMA



SLIKA 5. ŠTETE NA PLODU

## PREPORUKA

U CILJU SUZBIJANJA OBIČNE KRUŠKINE BUVE PREPORUČUJE SE PRIMENA INSEKTICIDA:

| PREPARAT        | AKTIVNA MATERIJA | DOZA          |
|-----------------|------------------|---------------|
| DELEGATE 250 WG | SPINETORAM       | 0,3-0,4 KG/HA |

PRILIKOM PRIMENE PESTICIDA, OBAVEZNO TREBA VODITI RAČUNA O KARENCI PRIMENJENIH PREPARATA KOJA ZA NAVEDENI INSEKTICID IZNOSI 7 DANA.

UZ INSEKTICID PREPORUČUJE SE I PRIMENA OKVAŠIVAČA KOJ IMA ULOGU RAZLAGANJA MEDNE ROSE I POJAČANJA INSEKTICIDNOG DELOVANJA.

.....

POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I DRAGI GLEDAOCI, DETALJNIJE INFORMACIJE O POJAVI ŠTETNIH ORGANIZAMA I MERAMA KONTROLE MOŽETE POGLEDATI NA SAJTU PROGNOZNO IZVEŠTAJNE SLUŽBE ZAŠTITE BILJA VOJVODINE [WWW.PISVOJVODINA.COM](http://WWW.PISVOJVODINA.COM)