

POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I DRAGI GLEDAOCI DOBRO DOŠLI U „ZELENU PROGNOZU“  
DANAS VAS INFORMIŠEMO O STANJU U USEVIMA KROMPIRA

---

## FAZE KROMPIRA

NA PODRUČJU VOJVODINE, USEVI KROMPIRA SE NALAZE U FAZI OD SKLAPANJA REDOVA DO POČETKA CVETANJA.



## PLAMENJAČA KROMPIRA (*Phytophthora infestans*) I CRNA PEGAVOST KROMPIRA (*Alternaria solani*)

PLAMENJAČA KROMPIRA JE U NAŠIM PROIZVODNIM USLOVIMA NAJZNAČAJNIJE OBOLJENJE KROMPIRA. U GODINAMA POVOLJNIM ZA NJEN RAZVOJ MOŽE SE JAVITI U EPIFITOTIČNIM RAZMERAMA.





SLIKA 2. SIMPTOM PLAMENJAČE KROPMIRA NA LISTU



SLIKA 3. SIMPTOM PLAMENJAČE NA LISTU

ČESTE PADAVINE U PROTEKLE DVE NEDELJE KONSTANTNO SU STVARALE POVOLJNE USLOVE ZA OSTVARENJE INFEKCIJA OVOM GLJIVOM. UKOLIKO DOĐE DO INFEKCIJA PLAMENJAČOM U FAZAMA INTENZIVNOG PORASTA KROMPIRA MOŽE DOĆI DO VELIKIH ŠTETA I ZNAČAJNOG GUBITKA PRINOSA.

TAKOĐE, PORED PLAMENJAČE KROMPIRA, PATOGEN KOJI JE REDOVNO PRISUTAN U NAŠIM PROIZVODNIM USLOVIMA JE PROUZROKOVAČ CRNE PEGAVOSTI KROMPIRA.



SIMPTOM 4. CRNE PEGAVOSTI KROMPIRA

USLOVI U KOJIMA SE ODVIJA PROIZVODNJA VEOMA SU POVOLJNI ZA RAZVOJ I ŠIRENJE I OVOG PATOGENA.



## PREPORUKA

U CILJU ZAŠTITE KROMPIRA OD NAVEDENIH PATOGENA PREPORUČUJU SE HEMIJSKE MERE ZAŠTITE NEKIM OD REGISTROVANIH FUNGICIDA KOJI U SEBI IMAJU SISTEMIČNU I KONTAKTNU KOMPONENTU KAO ŠTO SU:

| PREPARAT                           | AKTIVNA MATERIJA                    | DOZA           |
|------------------------------------|-------------------------------------|----------------|
| SILUETA                            | PROPAMOKRB-HIDROHLORID+MANKOZEB     | 4 L/HA         |
| CONSENTO                           | PROPAMOKARB-HIDROHLORID+FENAMIDON   | 1,67 – 2 L/HA  |
| KARDINAL PLUS                      | PROPAMOKARB-HIDROHLORID+FLUAZINAM   | 2 L/HA         |
| INFINITO SC                        | PROPAMOKARB-HIDROHLORID+FLUOPIKOLID | 1,2 – 1,6 L/HA |
| RIDOMIL GOLD MZ<br>68 WG, ALIJANSA | METALAKSIL-M+MANKOZEB               | 2,5 KG/HA      |
| LEONIDA                            | METALAKSIL-M+FLUAZINAM              | 0,5 – 0,6 L/HA |

**U USEVIMA KROMPIRA KOJI SU NAMENJENI ZA PROIZVODNJU MLADOG KROMPIRA NE PREPORUČUJU SE HEMIJSKE MERE ZAŠTITE.**

.....  
POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I POŠTOVANI GLEDAOCI, DETALJNIJE INFORMACIJE O POJAVI ŠTETNIH ORGANIZAMA I MERAMA KONTROLE MOŽETE POGLEDATI NA SAJTU PROGNOZNO IZVEŠTAJNE SLUŽBE ZAŠTITE BILJA VOJVODINE [WWW.PISVOJVODINA.COM](http://WWW.PISVOJVODINA.COM)