

## Zelena prognoza za 2.7.2018. - O stanju u zasadima jabuka i potrebi sprovođenja mera zaštite

### FAZE JABUKE

NA PODRUČJU VOJVODINE ZASADI JABUKA SE NALAZE U ZAVISNOSTI OD SORTIMENTA U RAZLIČITIM FAZAMA RAZVOJA PLODOVA. LETNJE SORTE SU U FAZI SAZREVANJA, A OSTALE SORTE SU U FAZI PLODOVI DOSTIGLI 70% KRAJNJE VELIČINE.



SLIKA 1. FAZA RAZVOJA JABUKE

**JABUKIN SMOTAVAC (*Carpocapsa pomonella*)**

JABUKIN SMOTAVAC JE NAJZNAČAJNIJA ŠTETOČINA JABUKE. U NAŠIM PROIZVODNIM USLOVIMA RAZVIJA TRI GENERACIJE GODIŠNJE.

ŠTETE PRIČINJAVAJU LARVE KOJE SE UBUŠUJU U PLODOVE I ISHRANJUJU MESOM PLODA I SEMENKAMA. NAPADNUTI PLODOVI PREVREMENO OTPADAJU I GUBE TRŽIŠNU VREDNOST.

U ZASADIMA JABUKA NA PODRUČJU VOJVODINE U TOKU JE PILJENJE LARVI DRUGE GENERACIJE JABUKINOG SMOTAVCA. U VIZUELNIM PREGLEDIMA PLODOVA JABUKA REGISTRUJE SE PRISUSTVO SVIH RAZVOJNIH STADIJUMA JAJA I TEK ISPILJENE LARVE OVE ŠTETOČINE.



SLIKA 2. JAJE JABUKINOG SMOTAVCA NA PLODU JABUKE (JAJE U FAZI „CRVENI OREOL“)



SLIKA 3. JAJE JABUKINOG SMOTAVCA NA PLODU (JAJE U FAZI „CRNA GLAVA“, NEPOSREDNO PRED PILJENJE)

#### PREPORUKA

U CILJU ZAŠTITE PLODOVA JABUKE OD UBUŠIVANJA LARVI JABUKINOG SMOTAVCA PREPORUČUJE SE PRIMENA SLEDEĆEG INSEKTICIDA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	KONCENTRACIJA
AFINEX, KESTREL, TONUS, MOSPILAN 20- SG	ACETAMIPRID	0,025%



## PEPELNICA JABUKE (*Podosphaera leucotricha*)

U ZASADIMA JABUKA SA OSETLJIVIM SORTIMENTOM REGISTRUJE SE PRISUSTVO SIMPTOMA PEPELNICE. USLOVI U KOJIMA SE NALAZIMO SU POVOLJNI ZA RAZVOJ OVOG PATOGENA.



SLIKA 4. SIMPTOM PEPELNICE JABUKE

### PREPORUKA

ZA SUZBIJANJE PEPELNICE JABUKE PREPORUČUJE SE PRIMENA NEKOG OD SLEDEĆIH FUNGICIDA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	DOZA/KONCENTRACIJA
TOPAS 100-EC	PENKONAZOL	0,04%
IMPACT 25 SC	FLUTRIAFOL	0,02%

U ZASADIMA JABUKA SA LETNJIM SORTAMA NE PREPORUČUJU SE HEMIJSKE MERE ZAŠTITE.