

POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I DRAGI GLEDAOCI DOBRO DOŠLI U „ZELENU PROGNOZU“

DANAS VAS INFORMIŠEMO O STANJU U USEVIMA ŠEĆERNE REPE

---

## **FAZE ŠEĆERNE REPE**

NA PODRUČJU VOJVODINE USEVI ŠEĆERNE REPE SE NALAZE U FAZI RAZVOJA KORENA.



### **PEGAVOST LISTA ŠEĆERNE REPE (*Cercospora beticola*)**

PEGAVOST LISTA ŠEĆERNE REPE JAVLJA SE SVAKE GODINE NA NAŠEM PROIZVODNOM PODRUČJU I JEDAN JE OD EKONOMSKI NAJZNAČAJNIJIH PATOGENA ŠEĆERNE REPE.

PEGE SE PRVO JAVLJAJU NA STARIJEM LIŠĆU U VIDU OKRUGLASTIH, SITNIH, SIVIH PEGA OVIČENIH MRKOM BOJOM. UNUTAR PEGE DOLAZI DO FORMIRANJA SPORONOSNIH ORGANA GLJIVE, KONIDIOFORA SA KONIDIJAMA, KOJIMA SE OVAJ PATOGEN DALJE ŠIRI. U POČETKU SE NA LISTOVIMA UOČAVAJU POJEDINAČNE PEGE, A KASNIJE DOLAZI DO POVEĆAVANJA BROJA PEGA, PRI ČEMU DOLAZI I DO SUŠENJA DELOVA ILI CELOG LISTA. RANO PROPADANJE LISNE MASE I POJAVA RETROVEGETACIJE NEGATIVNO UTIČU NA PRINOS KORENA I SADRŽAJ ŠEĆERA.



SLIKA 2. SIMPTOM PROUZROKOVAČA PEGAVOSTI LISTA ŠEĆERNE REPE


PRE DVE NEDELJE INFORMISALI SMO VAS O PRISUSTVU SIMPTOMA PEGAVOSTI LISTA ŠEĆERNE REPE I POTREBI SPROVOĐENJA HEMIJSKIH MERA ZAŠTITE U CILJU SUZBIJANJA NAVEDENOG PATOGENA. TOKOM OVE NEDELJE VIZUELNIM PREGLEDIMA USEVA ŠEĆERNE REPE REGISTROVANO JE POVEĆANJE BROJA BILJAKA SA PEGAMA.

USLOVI U PROIZVODNJI SU VEOMA POVOLJNI ZA RAZVOJ I ŠIRENJE OVOG PATOGENA, A NAJAVLJENE PADAVINE I PROGNOZIRANE TEMPERATURE U NAREDNOM PERIODU MOGU STVORITI NOVE POVOLJNE USLOVE ZA OSTVARENJE INFEKCIJA I DALJE ŠIRENJE PEGA.





SLIKA 3. SIMPTOM PROUZROKOVAČA PEGAVOSTI LISTA ŠEĆERNE REPE



SLIKA 4. SIMPTOM PROUZROKOVAČA PEGAVOSTI LISTA ŠEĆERNE REPE

## PREPORUKA

U CILJU ZAŠTITE ŠEĆERNE REPE OD PROUZROKOVAČA PEGAVOSTI LISTA ŠEĆERNE REPE PROIZVOĐAČIMA SE PREPORUČUJE PRIMENA KOMBINACIJE PREVENTIVNIH I SISTEMIČNIH FUNGICIDA:

PREVENTIVNI FUNGICIDI:

PREPARATI	AKTIVNA MATERIJA	DOZA
BRAVO 720 SC, DAKOFLO, BALEAR 720 SC	HLOROTALONIL	1,5 l/HA

SISTEMIČNI FUNGICIDI:

PREPARATI	AKTIVNA MATERIJA	DOZA
RIAS 300 EC	DIFENOKONAZOL + PROPIKONAZOL	0,3 l/HA
DUETT ULTRA, CERES	EPOSKIKONAZOL + TIOFANAT-METIL	0,4-0,6 l/HA
PROPULSE 250 SE	FLUOPIRAM + PROTIOKONAZOL	1-1,2 l/HA
BUMPER P	PROHLORAZ + PROPIKONAZOL	0,8 – 1 l/HA

ILI NEKI DRUGI REGISTROVANI FUNGICID.

POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I POŠTOVANI GLEDAOCI, DETALJNIJE INFORMACIJE O POJAVI ŠTETNIH ORGANIZAMA I MERAMA KONTROLE MOŽETE POGLEDATI NA SAJTU PROGNOZNO IZVEŠTAJNE SLUŽBE ZAŠTITE BILJA VOJVODINE [WWW.PISVOJVODINA.COM](http://WWW.PISVOJVODINA.COM)