

POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I DRAGI GLEDAOCI DOBRO DOŠLI U „ZELENU PROGNOZU“

DANAS VAS INFORMIŠEMO O STANJU U USEVIMA PAPRIKE

.....

FAZE PAPRIKE

NA PODRUČJU VOJVODINE USEVI PAPRIKE NA OTVORENOM POLJU SE, U ZAVISNOSTI OD LOKALITETA I NAČINA PROIZVODNJE, NALAZE U FAZI OD FORMIRANJA SPOREDNIH STABALA DO RAZLIČITIH FAZA CVETANJA I POČETKA FORMIRANJA PLODOVA.

VIZUELNIM PREGLEDOM USEVA PAPRIKE REGISTROVANO JE PRISUSTVO SLEDEĆIH ŠTETOČINA:

- LISNE VAŠI (*Aphididae*)
- TRIPSI (*Thysanoptera*)
- PAMUKOVA SOVICA (*Helicoverpa armigera*)
- SOVICA GAMA (*Autographa gamma*)

LISNE VAŠI (*Aphididae*) I TRIPSI (*Thysanoptera*)

VIZUELNIM PREGLEDIMA USEVA PAPRIKE REGISTROVANO JE PRISUSTVO LISNIH VAŠI I TRIPSA.




SLIKA 1. LISNE VAŠI NA LISTU I TRIPS NA CVETU PAPRIKE

LISNE VAŠI I TRIPSI PRIČINJAVAJU DIREKTNE I INDIREKTNE ŠTETE U USEVIMA PAPRIKE. IAKO DIREKTNE ŠTETE KOJE NASTAJU USLED SISANJA BILJNIH SOKOVA NISU ZANEMARLJIVE, MNOGO SU ZNAČAJNIJE INDIREKTNE ŠTETE KOJE SE OGLEDAJU U PRENOŠENJU BILJNIH VIRUSA.

PROIZVODNJU PAPRIKE U PROTEKLIH NEKOLIKO GODINA OBELEŽILO JE PRISUSTVO NEKOLIKO BILJNIH VIRUSA, A TAKOĐE REGISTROVANE SU I VELIKE ŠTETE NA USEVIMA. LISNE VAŠI SU VEKTORI VIRUSA MOZAIKA KRASTAVCA (Cucumber mosaic virus – CMV), DOK SU NEKE VRSTE TRIPSA PRENOSIOCI VIRUSA BRONZAVOSTI PARADAJZA (Tomato spotted wilt virus – TSWV).

PAMUKOVA SOVICA (*Helicoverpa armigera*) I SOVICA GAMA (*Autographa gamma*)

U USEVIMA PAPRIKE REGISTRUJU SE POLOŽENA JAJA PAMUKOVE SOVICE I SOVICE GAMA.



SLIKA 2. JAJE PAMUKOVE SOVICE NA LICU LISTA PAPRIKE



SLIKA 3. JAJE SOVICE GAMQ NA NALIČJU LISTA PAPRIKE

LARVE OVIH ŠTETOČINA PROUZROKUJU ŠTETE U TOKU SVOJE ISHRANE. LARVE SOVICE GAMA ISHRANJUJU SE LISTOVIMA, DOK LARVE PAMUKOVE SOVICE PORED LISNE MASE OŠTEĆUJU I GENERATIVNE ORGANE BILJAKA, ŠTO MOŽE DOVESTI DO VELIKIH ŠTETA POGOTOVO U FAZAMA ZAMETANJA PLODOVA.

TRENTUTNI USLOVI U PROIZVODNJI POGODUJU RAZVOJU SOVICA I U NAREDNOM PERIODU OČEKUJE SE INTENZIVNO POLAGANJE JAJA I POČETAK PILJENJA LARVI

PREPORUKA

POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA SE PREPORUČUJE PREGLED USEVA PAPRIKE NA PRISUSTVO ŠTETOČINA I UKOLIKO SE REGISTRUJE NJHOVO PRISUSTVO HEMIJSKE MERE ZAŠTITE.

U CILJU SUZBIJANJA VAŠI I SOVICA PREPORUČUJE SE PRIMENA INSEKTICIDA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	DOZA
PROTEUS 110 OD	TIAKLOPRID+DELTAMETRIN	0,5-0,75 L/HA

ILI NEKOG DRUGOG REGISTROVANOG INSEKTICIDA.

U CILJU SUZBIJANJA TRIPSA PREPORUČUJE SE PRIMENA INSEKTICIDA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	KONCENTRACIJA
LASER 240 CS	SPINOSAD	0,04-0,05%

TAKOĐE, VIZUELNIM PREGLEDIMA USEVA PAPRIKE REGISTRUJE SE PRISUSTVO SIMPTOMA BAKTERIOZNE PEGAVOSTI LISTA PAPRIKE.



SLIKA 4. SIMPTOM BAKTERIOZNE PEGAVOSTI LISTA PAPRIKE

OSNOVNA STRATEGIJA U SUZBIJANJU OVOG PATOGENA JESTE PRIMENA PREVENTIVNIH MERA ZAŠTITE. U SVIM USEVIMA PAPRIKE NEOPHODNO JE PRED NAJAVLJENE PADAVINE ILI ZALIVANJE KIŠENJEM PRIMENITI PREPARATE NA BAZI BAKRA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	KONCENTRACIJA/DOZA
FUNGOHEM-SC	BAKAR-HIDROKSID	0,4-0,6%
CHAMP DP	BAKAR-HIDROKSID	2 KG/HA

TRETMAN PREPARATIMA NA BAZI BAKRA TREBA SPROVESTI ZASEBNO OD TRETMANA INSEKTICIDIMA DA NE BI DOŠLO DO POJAVE FITOTOKSIČNOSTI. SPROVOĐENJE TRETMANA PREPORUČUJE SE U VEČERNJIM ČASOVIMA ZBOG VISOKIH DNEVNIH TEMPERATURA.

POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I POŠTOVANI GLEDAOCI, DETALJNIJE INFORMACIJE O POJAVI ŠTETNIH ORGANIZAMA I MERAMA KONTROLE MOŽETE POGLEDATI NA SAJTU PROGNOZNO IZVEŠTAJNE SLUŽBE ZAŠTITE BILJA VOJVODINE WWW.PISVOJVODINA.COM