

POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I DRAGI GLEDAOCI DOBRO DOŠLI U „ZELENU PROGNOZU“
DANAS VAS INFORMIŠEMO O STANJU U USEVIMA ŠEĆERNE REPE

.....

FAZE ŠEĆERNE REPE

NA PODRUČJU VOJVODINE USEVI ŠEĆERNE REPE SE NALAZE U FAZI RAZVIĆA KORENA.



SLIKA 1. FAZA RAZVOJA ŠEĆERNE REPE

PEGAVOST LIŠĆA ŠEĆERNE REPE (*Cercospora beticola*)

PEGAVOST LISTA ŠEĆERNE REPE PROUZROKUJE GLJIVA *Cercospora beticola* KOJA SE JAVLJA SVAKE GODINE U PROIZVODNIM USLOVIMA VOJVODINE I UTIČE NA PRINOS KORENA, SADRŽAJ ŠEĆERA I TEHNOLOŠKE OSOBINE KORENA REPE.

PEGE SE PRVO JAVLJAJU NA STARIJEM LIŠĆU U VIDU OKRUGLASTIH, SITNIH, SIVKASTIH PEGA KOJE SU OVIČENE ZONOM TKIVA MRKE BOJE. BROJ PEGA NA JEDNOM LISTU REPE MOŽE DOSTIĆI I NEKOLIKO STOTINA. SA RAZVOJEM BOLESTI BROJ PEGA SE POVEĆAVA, DOLAZI DO SUŠENJA MANJIH ILI VEĆIH DELOVA LISTA, USLED ČEGA LIŠĆE IZUMIRE, ŠTO JE NAROČITO IZRAŽENO U DUŽEM PERIODU SUŠE I VISOKIH TEMPERATURA. POSLE UGINUĆA VEĆEG BROJA LISTOVA DOLAZI DO RETROVEGETACIJE ŠTO ISCRPLJUJE BILJKE ŠEĆERNE REPE.

U BORBI PROTIV OVE BOLESTI NAJŠIRE SU UKLJUČENE HEMIJSKE MERE ZAŠTITE. PORED TOGA, NA ZAŠTITU REPE OD OVOG PATOGENA UTIČE I OSETLJIVOST SORTIMENTA, PLODORED, USLOVI U KOJIMA SE ODVIJA PROIZVODNJA I DR.

TRENUTNO SE U USEVIMA REGISTRUJE PRISUSTVO NOVIH PEGA. NA AUTOMATSKIM METEOROLOŠKIM STANICAMA KOJE SU POSTAVLJENE U USEVIMA ŠEĆERNE REPE, U PROTEKLOM PERIODU SU KONTINUIRANO REGISTROVANI VISOKI RIZICI ZA OSTVARENJE INFEKCIJE PROUZROKOVAČEM PEGAVOSTI LISTA ŠEĆERNE REPE KAO POSLEDICA JUTARNJIH ROSA I POVOLJNIH TEMPERATURA. TAKOĐE, OBILNE PADAVINE TOKOM JUČERAŠNJEG I DANAŠNJEG DANA OMOGUĆIĆE DALJI RAZVOJ I ŠIRENJE PATOGENA.

POSLEDNJA PREPORUKA ZA PRIMENU FUNGICIDA I ZAŠTITU USEVA ŠEĆERNE REPE DATA JE PRE PETNAEST DANA, TE SE VIŠE NE MOŽE RAČUNATI NA EFIKASNOST FUNGICIDA. PROIZVOĐAČIMA ŠEĆERNE REPE SE PREPORUČUJE DA ZAŠTITE USEVE. U SUPROTNOM, U USLOVIMA POVOLJNIM ZA ŠIRENJE BOLESTI SE MOŽE DESITI DA DOĐE DO GUBLJENJA LISNE POVRŠINE ŠTO MOŽE IZAZVATI PROCESSE RETROVEGETACIJE, ISCRPLJIVANJE BILJAKA I GUBITKE I U PRINOSU I U SADRŽAJU ŠEĆERA.




SLIKA 2. PEGA OD *Cercospora beticola*



SLIKA 3. SIMPTOM PEGAVOSTI LISTA ŠEĆERNE REPE



SLIKA 4. SIMPTOM PEGAVOSTI LISTA ŠEĆERNE REPE



SLIKA 5. SIMPTOM PEGAVOSTI LISTA ŠEĆERNE REPE



SLIKA 6. SIMPTOM PEGAVOSTI LIŠĆA ŠEĆERNE REPE



SLIKA 7. SIMPTOM PEGAVOSTI LISTA ŠEĆERNE REPE

PREPORUKA

ČIM VREMENSKI USLOVI DOZVOLE, U USEVIMA ŠEĆERNE REPE SE PREPORUČUJE PRIMENA KOMBINACIJE FUNGICIDA SA PREVENTIVNIM I SISTEMIČNIM MEHANIZMOM DELOVANJA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	DOZA	KARENCA
BRAVO 720 SC, DAKOFLO 720 SC, BALEAR 720 SC	HLOROTALONIL	1,5-2 L/HA	21 DAN
+	+	+	+
RIAS 300 EC, CERKOHEM, FLAMINGO, IMPERIJA	DIFENOKONAZOL+PROPIKONAZOL	0,3 L/HA	14 DANA

POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I DRAGI GLEDAOCI, DETALJNIJE INFORMACIJE O POJAVI ŠTETNIH ORGANIZAMA I MERAMA KONTROLE MOŽETE POGLEDATI NA SAJTU PROGNOZNO IZVEŠTAJNE SLUŽBE ZAŠTITE BILJA VOJVODINE WWW.PISVOJVODINA.COM