

POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I DRAGI GLEDAOCI DOBRO DOŠLI U „ZELENU PROGNOZU“
DANAS VAS INFORMIŠEMO O NAJZNAČAJNIJOJ ŠTETOČINI ŠLJIVA, ŠLJIVINOM SMOTAVCU

FENOFAZE ŠLJIVA

NA PODRUČJU VOJVODINE ŠLJIVE SE, U ZAVISNOSTI OD LOKALITETA I SORTIMENTA, NALAZE U FENOFAZI OD ZELENİ PLODNIK OKRUŽEN SASUŠENOM CVETNOM LOŽOM DO DRUGOG OPADANJA PLODOVA.



SLIKA 1. FAZA RAZVOJA ŠLJIVA

ŠLJIVIN SMOTAVAC (*Grapholita funebrana*)

ŠLJIVIN SMOTAVAC JE NAJZNAČAJNIJA ŠTETOČINA ŠLJIVE KOJA U NAŠIM PROIZVODNIM USLOVIMA RAZVIJA TRI GENERACIJE GODIŠNJE. PREZIMLJAVA KAO ODRASLA GUSENICA ISPOD KORE NA STABLU. NAKON ULUTKAVANJA PREZIMELIH GUSENICA U RANO PROLEĆE, TOKOM APRILA MESECA DOLAZI DO POJAVE ODRASLIH JEDINKI, A NEDUGO ZATIM I DO PARENJA I POLAGANJA JAJA. ŽENKE NAJČEŠĆE POLAŽU JAJA NA PLOD, A REĐE I NA LIST ŠLJIVE. ŠTETE PRIČINJAVAJU LARVE KOJE SE ISHRANJUJU MESOM PLODA. NAPADNUTI PLODOVI SE PREPOZNAJU PO SMOLOTOČINI KOJA CURI IZ NJIH. U UNUTRAŠNOSTI PLODA GUSENICA PRAVI TAMNE HODNIKE U KOJIMA SE NALAZI GUSENIČNI IZMET. USLED OŠTEĆENJA OD ISHRANE LARVI DOLAZI DO PREVREMENOG SAZREVANJA I OPADANJA PLODOVA.



SLIKA 2. CURENJE SMOLE IZ NAPADNUTOG PLODA ŠLJIVE

VIZUELNIM PREGLEDIMA ZASADA ŠLJIVA REGISTROVANA SU JAJA SVIH RAZVOJNIH STADIJUMA KAO I TEK ISPILJENE LARVE. U TOKU JE PILJENJE LARVI PRVE GENERCIJE OVE ŠTETOČINE.



SLIKA 3. POLOŽENO JAJE ŠLJIVINOG SMOTAVCA NA PLODU



SLIKA 4. SVEŽE POLOŽENO JAJE ŠLJIVINOG SMOTAVCA NA PLODU



SLIKA 5. SVEŽE POLOŽENO JAJE ŠLJIVINOG SMOTAVCA NA PLODU

PREPORUKA

U CILJU SPREČAVANJA UBUŠIVANJA LARVI ŠLJIVINOG SMOTAVCA U PLODOVE, PREPORUČUJU SE HEMIJSKE MERE ZAŠTITE NEKIM OD REGISTROVANIH INSEKTICIDA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	KONCENTRACIJA
DECIS 2,5 EC, FUTOCIS 2,5-EC, KONFUZIJA	DELTAMETRIN	0,03 – 0,05%
GROM	LAMBDA-CIHALOTRIN	0,03%

.....
POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I POŠTOVANI GLEDAOCI, DETALJNIJE INFORMACIJE O POJAVI ŠTETNIH ORGANIZAMA I MERAMA KONTROLE MOŽETE POGLEDATI NA SAJTU PROGNOZNO IZVEŠTAJNE SLUŽBE ZAŠTITE BILJA VOJVODINE WWW.PISVOJVODINA.COM