

Zelena prognoza za 6.6.2019. - O TRIPSIMA, VEOMA ZNAČAJNIM ŠTETOČINAMA U POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI NA NAŠEM PODRUČJU

TRIPSI SU VELIKA GRUPA INSEKATA MEĐU KOJIMA SU MNOGI ŠTETOČINE POLJOPRIVREDNIH KULTURA. TO SU SIĆUŠNI ORGANIZMI, VELIČINE TELA OKO 1 MM, IMAJU SPLJOŠTEN I IZDUŽEN TELO KOJE SE NA KRAJEVIMA SUŽAVA. BOJA ODRASLIH JEDINKI JE SVETLO DO TAMNO SMEĐA. IMAJU DUGA I TANKA KRILA OBRASLA DLAČICAMA KOJE PODSEĆAJU NA RESE. USNI APARAT IM JE PRILAGOĐEN ZA BODENJE I SISANJE.

U POSLEDNJIH NEKOLIKO GODINA, PRISUTNA JE PROGRESIJA OVE GRUPE INSEKATA NA NAŠEM PODRUČJU. OD VOĆNIH VRSTA, TRENUTNO SU NAJUGROŽENIJE BRESKVE, NEKTARINE I JABUKE.



SLIKA 1. ODRASLA JEDINKA TRIPSA



SLIKA 2. ODRASLE JEDINKE TRIPSA

ŠTETE OD TRIPSA NASTAJU USLED ISHRANE LARVI I ODRASLIH JEDINKI KAO I USLED PROCESA POLAGANJA JAJA. TO SU DIREKTNE ŠTETE KOJE DOVODE DO RAZLIČITIH NEKROZA I DEFORMITETA NA PLODOVIMA.

TAKOĐE, VEOMA ZNAČAJNE SU I INDIREKTNE ŠTETE KOJE OVI ORGANIZMI NANOSE POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI. NEKE VRSTE TRIPSA KOJE SU PRISUTNE U SRBIJI IMAJU KARANTINSKI STATUS U NEKIM ZEMLJAMA GDE SE IZVOZI NAŠE VOĆE. OVA ČINJENICA MOŽE DA OGRANIČI IZVOZ VOĆA I ZAHTEVA DODATNU PAŽNJU PROIZVOĐAČA.



SLIKA 3. SIMPTOM OŠTEĆENJA OD TRIPSA NA BRESKVAMA



SLIKA 4. SIMPTOM OŠTEĆENJA OD TRIPSA NA JABUCI

PREPORUKA

PROIZVOĐAČIMA JABUKA, BRESAKA I NEKTARINA SE PREPORUČUJE OBAVEZAN PREGLED ZASADA NA PRISUSTVO TRIPSA. PREGLED JE NAJLAKŠE OBAVITI METODOM OTRESANJA BILJNIH DELOVA NA BELU PODLOGU (PAPIR, TACNU I SL.). UKOLIKO SE REGISTRUJE PRISUSTVO TRIPSA PREPORUČUJE SE PRIMENA SLEDEĆEG PREPARATA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	KONCENTRACIJA
EXIREL	CIJANTRANILIPROL	0,075-0,1%.

KARENCA NAVEDENOG INSEKTICIDA U ZASADIMA JABUKA, BRESAKA I NEKTARINA IZNOSI 7 DANA.