

Zelena prognoza za 8.8.2018. - O stanju u usevima šećerne repe

FAZE ŠEĆERNE REPE

NA PODRUČJU VOJVODINE USEVI ŠEĆERNE REPE SE NALAZE U FAZI RAZVIĆA KORENA.



SLIKA 1. USEV ŠEĆERNE REPE

PEGAVOST LISTA ŠEĆERNE REPE (*Cercospora beticola*)

PEGAVOST LISTA ŠEĆERNE REPE JAVLJA SE SVAKE GODINE NA NAŠEM PROIZVODNOM PODRUČJU I UTIČE NA PRINOS KORENA I SADRŽAJ ŠEĆERA.

U BORBI PROTIV OVE BOLESTI NAJŠIRE SU UKLJUČENE HEMIJSKE MERE ZAŠTITE. TAKOĐE, ZNAČAJNU ULOGU U RAZVOJU BOLESTI IMA SORTIMET KAO I USLOVI U KOJIMA SE ODVIJA PROIZVODNJA REPE.

PROIZVODNI USLOVI U TOKU OVE VEGETACIONE SEZONE SU VEOMA POVOLJNI ZA INFEKCIJU I RAZVOJ BOLESTI. NA AUTOMATSKIM METEOROLOŠKIM STANICAMA KOJE SU POSTAVLJENE U USEVE ŠEĆERNE REPE, SKORO SVAKODNEVNO SE REGISTRUJU IZUZETNO POVOLJNI USLOVI ZA RAZVOJ PROUZROKOVAČA PEGAVOSTI LISTA I TO NA CELOM PODRUČJU VOJVODINE.

POSLEDNJA PREPORUKA ZA PRIMENU FUNGICIDA I ZAŠTITU USEVA ŠEĆERNE REPE DATA JE 25. JULA, TE SE VIŠE NE MOŽE RAČUNATI NA EFIKASNOST FUNGICIDA. PROIZVOĐAČIMA ŠEĆERNE REPE SE PREPORUČUJE DA ZAŠTITE USEVE. U USLOVIMA POVOLJNIM ZA ŠIRENJE BOLESTI SE MOŽE DESITI DA DOĐE DO GUBLJENJA LISNE POVRŠINE ŠTO ĆE IZAZVATI PROCESSE RETROVEGETACIJE, ISCRPLJIVANJE BILJAKA I GUBITKE I U PRINOSU I U SADRŽAJU ŠEĆERA.



SLIKA 2. SIMPTOM PEGAVOSTI LISTA ŠEĆERNE REPE



SLIKA 3. SIMPTOM PEGAVOSTI LISTA ŠEĆERNE REPE

PREPORUKA

ZA SUZBIJANJE PEGAVOSTI LISTA ŠEĆERNE REPE, PREPORUČUJE SE PRIMENA SLEDEĆEG FUNGICIDA:

| PREPARAT | AKTIVNA MATERIJA | DOZA |
|-----------------|------------------------|------------|
| PROPULSE 250 SE | FLUOPIRAM+PROTIKONAZOL | 1-1,2 L/HA |