

POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I DRAGI GLEDAOCI DOBRO DOŠLI U „ZELENU PROGNOZU“

DANAS VAS INFORMIŠEMO O STANJU U ZASADIMA KRUŠAKA

FAZE RAZVOJA KRUŠAKA

NA PODRUČJU VOJVODINE, ZAVRŠENA JE BERBA RANIH I SREDNJIH SORTI KRUŠAKA.

NAJZASTUPLJENIJA SORTA, VLJAMOVKA, NALAZI SE U ZAVISNOSTI OD LOKALITETA, EKSPOZICIJE TERENA I PRIMENJENE AGROTEHNIKE, U FENOFAZI OD POČETAK ZRENJA, POJAVLJUJE SE KARAKTERISTIČNA BOJA ZA SORTU DO NAPREDOVANJE ZRENJA, POVEĆANJE KARAKTERISTIČNE BOJE ZA SORTU. U NAREDNIH NEDELJU DANA SE OČEKUJE POČETAK BERBE KOD OVE SORTE.

KASNE SORTE KRUŠAKA (ABATE FETEL, KIFEROV SEJANAC, PAKAM TRIJUMF), NALAZE SE U FENOFAZI PLODOVI DOSTIGLI OKO 90% KRAJNJE VELIČINE.



SLIKA 1. FAZA RAZVOJA KRUŠKE SORTE VILJAMOVKA

OBIČNA KRUŠKINA BUVA

OBIČNA KRUŠKINA BUVA JE NAJZNAČAJNIJA ŠTETOČINA KRUŠKE U NAŠIM AGROEKOLOŠKIM USLOVIMA. IMA IZUZETNO VELIK REPRODUKTIVNI POTENCIJAL A U TOKU JEDNE GODINE MOŽE RAZVITI I DO 7 GENERACIJA. DIREKTNE ŠTETE PRAVE LARVE SISAJUĆI SOKOVE IZ SVIH NADZEMNIH DELOVA BILJKE. LARVE PROLAZE KROZ PET STUPNJEVA RAZVOJA. U TOKU ISHRANE ONE LUČE MEDNU ROSU KOJA JE VEOMA POGODNA PODLOGA ZA RAZVOJ GLJIVE ČAĐAVICE. PRISUSTVO ČAĐAVICE NA MLADARIMA SE NEGATIVNO ODRAŽAVA NA PROCES FOTOSINTEZE A SAMIM TIM I NA RAZVOJ BILJAKA I PRINOS. ČAĐAVI PLODOVI GUBE KVALITET I TRŽIŠNU VREDNOST.




SLIKA 2. RAZVOJNI STADIJUMI OBIČNE KRUŠKINE BUVE

TREKUTNO SE U KRUŠICIMA REGISTRUJE PRISUSTVO SVIH RAZVOJNIH STADIJUMA OBIČNE KRUŠKINE BUVE. NA PODRUČJU VOJVODINE, POČETAK PILJENJA LARVI PETE LETNJE GENERACIJE SE OČEKUJE U NAREDNIH NEKOLIKO DANA.



SLIKA 3. LIST KRUŠKE SA LARVAMA U MEDNOJ ROSI



SLIKA 4. PLOD KRUŠKE SA LARVAMA U MEDNOJ ROSI




SLIKA 5. ŠTETE NA MLADARIMA



SLIKA 6. ŠTETE NA PLODU



SLIKA 7. JAJA I LARVE OBIČNE KRUŠKINE BUVE NA NALIČJU LISTA KRUŠKE



SLIKA 8. LARVE OBIČNE KRUŠKINE BUVE NA NALIČJU LISTA KRUŠKE



SLIKA 9. LARVE I JAJA OBIČNE KRUŠKINE BUVE NA NALIČJU LISTA KRUŠKE

PREPORUKA

U CILJU SUZBIJANJA OBIČNE KRUŠKINE BUVE, U ZASADIMA SA KASNIM SORTIMENTOM, PREPORUČUJE SE PRIMENA NEKOG OD INSEKTICIDA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	DOZA	KARENCA	MBT
DELEGATE 250 WG	SPINETORAM	0,3-0,4 KG/HA	7 DANA	2
KULISA, APACHE 50 WG	KLOTIANIDIN	350 G/HA	14 DANA	2

PRILIKOM PRIMENE PESTICIDA, OBAVEZNO TREBA VODITI RAČUNA O KARENCI I MAKSIMALNOM BROJU TRETMANA (MBT) U TOKU JEDNE VEGETACIJE PRIMENJENIH PREPARATA.

PREPORUKA JE DA SE TRETMAN SPROVEDE U VEČERNJIM ČASOVIMA ZBOG VISOKIH DNEVNIH TEMPERATURA VAZDUHA, A UZ INSEKTICID SE PREPORUČUJE I PRIMENA OKVAŠIVAČA KOJI IMA ULOGU RAZLAGANJA MEDNE ROSE I POJAČANJA INSEKTICIDNOG DELOVANJA.

.....

POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I DRAGI GLEDAOCI, DETALJNIJE INFORMACIJE O POJAVI ŠTETNIH ORGANIZAMA I MERAMA KONTROLE MOŽETE POGLEDATI NA SAJTU PROGNOZNO IZVEŠTAJNE SLUŽBE ZAŠTITE BILJA VOJVODINE WWW.PISVOJVODINA.COM