

POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I DRAGI GLEDAOCI DOBRO DOŠLI U „ZELENU PROGNOZU“
DANAS VAS INFORMIŠEMO O STANJU U ZASADIMA JABUKA

.....

FAZE JABUKA

NA PODRUČJU VOJVODINE, JABUKE SE U ZAVISNOSTI OD SORTIMENTA NALAZE U RAZLIČITIM FAZAMA RAZVOJA. NAJVEĆE POVRŠINE POD JABUKOM NA KOJIMA SU ZASTUPLJENE SORTE AJDARED, ZLATNI DELIŠES, JONAGOLD, GRENI SMIT, NALAZE SE U FAZI OD POČETKA ZRENJA PLODOVA DO POJAVE BOJE KARAKTERISTIČNE ZA SORTU. U ZASADIMA SA RANIM SORTAMA, POPUT GALE I PRIME, U TOKU JE BERBA PLODOVA.



SLIKA 1. FAZA RAZVOJA JABUKA



SLIKA 2. FAZA RAZVOJA JABUKA

JABUKIN SMOTAVAC (*Carpocapsa pomonella*)

JABUKIN SMOTAVAC JE NAJZNAČAJNIJA ŠTETOČINA JABUKE U NAŠIM PROIZVODNIM USLOVIMA.

ŠTETE PROUZROKUJU LARVE KOJE SE ODMAH NAKON PILJENJA UBUŠUJU U PLODOVE. ISHRANJUJU SE MESOM PLODA I SEMENKAMA PRI ČEMU PRAVE HODNIKE U PLODU I PRLAJU GA IZMETOM. TAKVI PLODOVI PREVREMENO OPADAJU I GUBE TRŽIŠNU VREDNOST.



SLIKA 3. UBUŠENJE OD LARVE JABUKINOG SMOTAVCA NA PLODU



SLIKA 4. LARVA JABUKINOG SMOTAVCA U PLODU

U VIZUELNIM PREGLEDIMA PLODOVA JABUKE UTVRĐENO JE PRISUSTVO JAJA U RAZLIČITIM FAZAMA RAZVOJA KAO I TEK ISPILJENE LARVE.

U ZASADIMA JABUKA NA PODRUČJU VOJVODINE U TOKU JE POLAGANJE JAJA I POČETAK PILJENJA LARVI TREĆE GENERACIJE OVE ŠTETOČINE.



SLIKA 5. JAJE JABUKINOG SMOTAVCA NA PLODU



SLIKA 6. JAJE JABUKINOG SMOTAVCA NA PLODU



SLIKA 7. JAJE JABUKINOG SMOTAVCA NA PLODU



SLIKA 8. LARVA JABUKINOG SMOTAVCA NA PLODU

PREPORUKA

U CILJU SPREČAVANJA UBUŠIVANJA LARVI JABUKINOG SMOTAVCA U PLODOVE PREPORUČUJE SE PRIMENA NEKOG OD NAVEDENIH INSEKTICIDA SA KRATKOM KARENCOM:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	DOZA	KARENCA
AVAUNT 15 EC	INDOKSAKARB	0,5 L/HA	7 DANA
EXIREL	CIJANTRANILIPROL	0,06%	7 DANA
RUNNER 240 SC	METOKSIFENOZID	0,04-0,06%	14 DANA

U ZASADIMA U KOJIMA JE BERBA U TOKU ILI SE USKORO OČEKUJE, NE PREPORUČUJE SE PRIMENA INSEKTICIDA.

SKLADIŠNE BOLESTI JABUKA

U ZAVRŠNIM FAZAMA SAZREVANJA PLODOVA, JABUKU TREBA ZAŠTITITI OD SKLADIŠNIH BOLESTI. NAJČEŠĆI PATOGENI KOJI SE JAVLJAJU NA JABUKAMA TOKOM SKLADIŠTENJA SU:

- ČAĐAVA KRASTAVOST PLODOVA (*Venturia inaequalis*)
- SMEĐA ILI MRKA TRULEŽ PLODOVA (*Monilinia fructigena*)
- GORKA TRULEŽ PLODOVA (*Colletotrichum gleosporoides*)
- MEKA TRULEŽ PLODOVA (*Penicillium spp.*)

U CILJU ZAŠTITE PLODOVA OD SKLADIŠNIH PATOGENA PREPORUČUJE SE PAŽLJIVO RUKOVANJE PLODOVIMA TOKOM BERBE I IZBEGAVANJE MEHANIČKIH OŠTEĆENJA, SKLADIŠTENJE PLODOVA U ADEKVATNIM USLOVIMA I HEMIJSKE MERE ZAŠTITE PLODOVA. PRIMENU PREPARATA ZA SPREČAVANJE RAZVOJA BOLESTI U SKLADIŠTU TREBA POZICIONIRATI PRED BERBU UZIMAJUĆI U OBZIR KARENCE IZABRANOG PREPARATA. FUNGICIDI KOJI SU REGISTROVANI ZA SUZBIJANJE SKLADIŠNIH BOLESTI SU:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	DOZA	KARENCA U DANIMA
ZATO 50 WG	TRIFLOKSISTROBIN	150 G/HA	14 DANA
BELLIS	BOSKALID+ PIRAKLOSTROBIN	0,8 KG/HA	7 DANA
SWITCH 62,5 WG	CIPRODINIL+ FLUDIOKSINIL	0,8-1 KG/HA	3 DANA
GEOXE 50 WG	FLUDIOKSINIL	0,4-0,45 KG/HA	3 DANA



SLIKA 9. ZDRAV PLOD JABUKE

.....
POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I POŠTOVANI GLEDAOCI, DETALJNIJE
INFORMACIJE O POJAVI ŠTETNIH ORGANIZAMA I MERAMA KONTROLE MOŽETE POGLEDATI
NA SAJTU PROGNOZNO IZVEŠTAJNE SLUŽBE ZAŠTITE BILJA VOJVODINE
WWW.PISVOJVODINA.COM