

BILJNA VRSTA: JABUKA

TEMA: AKTUELNA ZAŠTITA JABUKE OD PROUZROKOVAČA BOLESTI

NA PODRUČJU VOJVODINE ZASADI JABUKA SE U ZAVISNOSTI OD LOKALITETA, EKSPOZICIJE TERENA I SORTIMENTA NALAZE U FAZI OD POJAVE CVETNIH PUPOLJAKA DO POČETKA CVETANJA.

ZA PODRUČJE VOJVODINE SE OD PETKA NAJAVLJUJE VIŠEDNEVNI KIŠNI PERIOD KOJI MOŽE STVORITI POVOLJNE USLOVE ZA INFEKCIJU NAJZNAČAJNIJIM PATOGENOM U PROIZVODNJI JABUKE, PROUZROKOVAČEM ČAĐAVE PEGAVOSTI LIŠĆA I KRSTAVOSTI PLODOVA JABUKE.

SADA JE VEOMA VAŽNO ZAŠTITI JABUKU U VEOMA OSETLJIVIM FAZAMA CVETANJA. UKOLIKO DOĐE DO ZARAŽE CVETA U RANIM FAZAMA NJIHOVOG RAZVOJA ONI SE SUŠE I OPADAJU. TAKOĐE, I NAPADNUTI LISTOVI PREVREMENO OPADAJU ŠTO SE ODRAŽAVA NA PRINOS.

PREPORUKA: SA CILJEM ZAŠTITE JABUKE OD ČAĐAVE PEGAVOSTI, PRE NAJAVLJENIH PADAVINA OD PETKA, PREPORUČUJE SE PRIMENA KOMBINACIJE FUNGICIDA KONTAKTNOG I SISTEMIČNOG DELOVANJA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	DOZA/KONCENTRACIJA
DELAN 700 WG, SHANON	DITIANON	0,07%
FIESTA, GALILEO		0,75-1 KG/HA
ALCOBAN		0,5-0,75 KG/HA
	+	
CALCIO, CORMAX	CIPRODINIL	0,2 KG/HA
CHORUS 50 WG, CIPRODEX		0,05%
NEON		0,5-0,7 L/HA
DIVETO, KANTOR		0,75-1 L/HA.

U POJEDINIM ZASADIMA JABUKE SE REGISTRUJE PRISUSTVO SIMPTOMA PEPELNICE JABUKE U VIDU BELIH MLADARA. U ZASADIMA SA OSETLJIVIM SORTIMENTOM POPUT AJADREDA, JONAGOLDA, RED JONAPRINCA I DR, PEPELNICA MOŽE PRIČINITI VELIKE ŠTETE.

PREPORUKA: U ZASADIMA SA OSETLJIVIM SORTIMENTOM I GDE SU PRISUTNI SIMPTOMI PEPELNICE, PORED MEHANIČKOG UKLANJANJA ZARAŽENIH MLADARA, PREPORUKA JE I PRIMENA NEKOG OD SLEDEĆIH FUNGICIDA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	DOZA
STROBY DF, LUNAR, ASENA	KRESOKSIM-METIL	0,02%
KARATHANE GOLD 350 EC	MEPTILDINOKAP	0,4-0,5 L/HA

U PERIODU CVETANJA JABUČASTOG VOĆA MOŽE DOĆI DO INFEKCIJE CVETA PROUZROKOVAČEM BAKTERIOZNE PLAMENJAČE JABUČASTOG VOĆA. TO JE NAJDESTRUKTIVNIJI PATOGEN JABUČASTOG VOĆA JER ZA KRATKO VREME MOŽE NAPRAVITI IZUZETNO VELIKI ŠTETE. U VLAŽNIM USLOVIMA, OVA BAKTERIJA SE VEOMA BRZO ŠIRI, A KOD MLADIH VOĆAKA MOŽE U JEDNOJ VEGETACIJI IZAZVATI POTPUNO SUŠENJE STABALA.

PREPORUKA: SA CILJEM ZAŠTITE OD BAKTERIOZNE PLAMENJAČE, U ZASADIMA KOJI SU UŠLI U FAZU CVETANJA, PRE NAJAVLJENIH PADAVINA SE PREPORUČUJE PRIMENA NEKOG OD REGISTROVANIH PREPARATA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	DOZA/KONCENTRACIJA
FUNGURAN OH	BAKAR-HIDROKSID	0,05-0,06%
ALIETTE FLASH	FOSETIL-ALUMINIJUM	0,4-0,45%
FOSCO	FOSETIL-ALUMINIJUM	0,3%
FORTUNA	FOSETIL-ALUMINIJUM	0,4-0,45%
LEGAT SP	FOSETIL-ALUMINIJUM	4-4,5 KG/HA
ERWIX	BACILLUS SUPTILIS	10 L/HA

DETALJNIJE INFORMACIJE O ŠTETNIM ORGANIZMIMA I MERAMA NJIHOVE KONTROLE MOŽETE POGLEDATI NA PORTALU PROGNOZNO-IZVEŠTAJNE SLUŽBE ZA ZAŠTITU BILJA AP VOJVODINE.



SLIKA 1. FAZE RAZVOJA JABUKE



SLIKA 2. SIMPTOM ČAĎAVE PEGAVOSTI LIŠČA I KRASTAVOSTI PLODOVA JABUKE NA PLODU



SLIKA 3. SIMPTOM ČAĐAVE PEGAVOSTI LIŠĆA I KRSTAVOSTI PLODOVA JABUKE NA LISTU



SLIKA 4. SIMPTOM PEPLNICE JABUKE



SLIKA 5. SIMPTOM BAKTERIOZNE PLAMENJAČE NA GRANI JABUKE, „PASTIRSKI ŠTAP“