

POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I DRAGI GLEDAOCI DOBRO DOŠLI U „ZELENU PROGNOZU“

DANAS VAS INFORMIŠEMO O KROMPIROVOM MOLJCU I MERAMA KONTROLE OVE ŠTETOČINE KOJE JE NEOPHODNO PREDUZETI U OVOM PERIODU

.....

FAZE KROMPIRA

NA PODRUČJU VOJVODINE, USEVI KROMPIRA SE, U ZAVISNOSTI OD LOKALITETA, SORTIMENTA I VREMENA SADNJE, NALAZE U FAZI OD VAĐENJA KRTOLA DO RAZLIČITIH FAZA SUŠENJA NADZEMNOG DELA BILJKE.



SLIKA 1. VAĐENJE KRTOLA KROMPIRA



SLIKA 2. VAĐENJE KRTOLA KROMPIRA

KROMPIROV MOLJAC (*Phthorimaea operculella*)

NA NAŠEM PROIZVODNOM PODRUČJU, USLED KLIMATSKIH PROMENA I PORASTA TEMPERATURA, JEDNA OD NAJZNAČAJNIJA ŠTETOČINA KROMPIRA JE POSTAO KROMPIROV MOLJAC.

ŽENKA KROMPIROVOG MOLJCA POLAŽE JAJA NA ZEMLJU OKO BILJAKA ILI NA KRTOLE PROLAZEĆI KROZ PUKOTINE U ZEMLJIŠTU. KADA SE ISPILE, LARVE SE UBUŠUJU U KRTOLE U KOJOJ PRAVE HODNIKE ISPOD POKOŽICE. TAKVE KRTOLE GUBE TRŽIŠNU VREDNOST. PORED TOGA, NAPADNUTE KRTOLE SU OSETLJIVE NA INFEKCIJE PROUZROKOVAČIMA RAZLIČITIH VRSTA TRULEŽI I VRLO BRZO MOGU DA U POTPUNOSTI DA PROPADNU.



SLIKA 3. JAJA KROMPIROVOG MOLJCA NA KRTOLI



SLIKA 4. JAJA KROMPIROVOG MOLJCA NA KRTOLI



SLIKA 5. LARVA KROMPIROVOG MOLJCA U KRTOLI



SLIKA 6. ŠTETE NA KRTOLAMA OD KROMPIROVOG MOLJCA



SLIKA 7. ŠTETE NA KRTOLI OD KROMPIROVOG MOLJCA

U NAŠIM AGROEKOLOŠKIM USLOVIMA OVA ŠTETOČINA MOŽE DA RAZVIJE 5 GENERACIJA U POLJU, A U SKLADIŠTIMA MOŽE RAZVITI JOŠ 2 DO 3 GENERACIJE.

NA FEROMONSKIM KLOPKAMA KOJE SU POSTAVLJENE U USEVE KROMPIRA, REGISTRUJE SE POVEĆANJE ULOVA ODRASLIH JEDINKU U POSLEDNJIH NEKOLIKO DANA. ZAPOČELA JE AKTIVNOST ČETVRTE GENERACIJE KROMPIROVOG MOLJCA. U NAREDNIH NEDELJU DANA SE OČEKUJE POVEĆANJE BROJNOSTI KAO POSLEDICA PREKLAPANJA LETA LEPTIRA TREĆE I ČETVRTE GENERACIJE.



SLIKA 8. ODRASLE JEDINKE KROMPIROVOG MOLJCA (ULOV NA FEROMONSKIM KLOPKAMA)

PREPORUKA

U CILJU ZAŠTITE KROMPIRA OD KROMPIROVOG MOLJCA PREPORUČUJU SE SLEDEĆE MERE:

- KOD USEVA GDE JE CIMA SUVA, OBAVEZNO TREBA VADITI KROMPIR I ČUVATI GA U SKLADIŠTIMA U KOJIMA JE KONTROLISANA TEMPERATURA. SKLADIŠTA KROMPIRA TREBA DA SU NA SVIM OTVORIMA OBEZBEĐENA GUSTIM MREŽAMA KAKO BI SE SPREČIO ULAZAK ODRASLIH JEDINKI I DALJI RAZVOJ MOLJCA.
- KRTOLE KROMPIRA NAKON VAĐENJA NE TREBA OSTAVLJATI NA PARCELAMA I U DVORIŠTIMA VEĆ ŠTO BRŽE UNOSITI U SKLADIŠTA KAKO NE BI DIREKTNO BILE IZLOŽENE NAPADU MOLJCA.
- NA USEVIMA GDE CIMA JOŠ UVEK NIJE PROPALA, PREPORUČUJE SE ODRŽAVANJE KOMPAKTNOSTI ZEMLJIŠTA NAVODNJAVANJEM KAKO BI SE SPREČILO STVARANJE PUKOTINA I ZAŠTITILE KRTOLE POD ZEMLJOM. U OVIM USEVIMA, GDE SE KROMPIR NEĆE USKORO VADITI, PREPORUČUJU SE I HEMIJSKE MERE ZAŠTITE INSEKTICIDOM:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	DOZA	KARENCA
GROM	LAMBDA-CIHALOTRIN	0,25 L/HA	7 DANA



SLIKA 9. POVAĐENE KRTOLE KROMPIRA



SLIKA 10. USEV KROMPIRA GDE JOŠ UVEK NIJE PROPALA CIMA

.....
POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I DRAGI GLEDAOCI, DETALJNIJE INFORMACIJE O
POJAVI ŠTETNIH ORGANIZAMA I MERAMA KONTROLE MOŽETE POGLEDATI NA SAJTU
PROGNOZNO IZVEŠTAJNE SLUŽBE ZAŠTITE BILJA VOJVODINE WWW.PISVOJVODINA.COM