

POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I DRAGI GLEDAOCI DOBRO DOŠLI U „ZELENU PROGNOZU“

DANAS VAS INFORMIŠEMO O PRISUTNIM ŠTETOČINAMA U PROIZVODNJI KUPUSA

.....

FAZE KUPUSA

NA PODRUČJU VOJVODINE USEVI KUPUSA SE NALAZE U RAZLIČITIM FAZAMA RAZVOJA U ZAVISNOSTI OD VREMENA RASAĐIVANJA I DUŽINE VEGETACIJE GAJENE SORTE ODNOSNO HIBRIDA. KUPUSI ZA LETNJU PROIZVODNJU SE NALAZE U RAZLIČITIM FAZAMA FORMIRANJA GLAVICE, OD FAZE GLAVICE DOSTIGLE 30% OD OČEKIVANE VELIČINE DO GLAVICE DOSTIGLE 50% OD OČEKIVANE VELIČINE. USEVI KUPUSA NAMENJENI ZA JESENJU PROIZVODNJU SE NALAZE U RAZLIČITIM FAZAMA RAZVOJA LISTOVA.



SLIKA 1. FAZA RAZVOJA LETNJEG KUPUSA



SLIKA 2. FAZA RAZVOJA JESENJEG KUPUSA

VIZUELNIM PREGLEDOM BILJAKA KUPUSA, UOČENO JE PRISUSTVO JAJA I LARVI KUPUSOVOG MOLJCA NA NALIČJU LISTOVA. PROCENAT NAPADNUTIH BILJAKA SE KREĆE I DO 30.

KUPUSOV MOLJAC JE NAJZNAČAJNIJA ŠTETOČINA KUPUSA KOD NAS. ŠTETE PRAVE LARVE HRANEĆI SE LISTOVIMA, A U KASNIJIM FAZAMA RAZVOJA UBUŠUJU SE U GLAVICU. VISOKE TEMPERATURE POGODUJU RAZVOJU MOLJCA, TAKO DA JEDNA CELA GENERACIJA MOŽE DA SE RAZVIJE ZA SVEGA SEDAM DO DESET DANA. U NAŠIM AGROEKOLOŠKIM USLOVIMA KUPUSOV MOLJAC IMA SEDAM DO OSAM GENERCIJA, A TRENUTNO JE U TOKU RAZVOJ I PILJENJE LARVI ŠESTE GENERACIJE.



SLIKA 3. LARVE KUPUSOVOG MOLJCA NA NALIČJU LISTA KUPUSA



SLIKA 4. LARVA KUPUSOVOG MOLJCA NA NALIČJU LISTA KUPUSA



SLIKA 5. LARVA KUPUSOVOG MOLJCA NA NALIČJU LISTA KUPUSA



SLIKA 6. LARVA KUPUSOVOG MOLJCA NA NALIČJU LISTA KUPUSA

TAKOĐE, VIZUELNIM PREGLEDOM BILJAKA, REGISTROVANO JE I PRISUSTVO:

- LARVI MALOG KUPUSARA (*Pieris rapae*),
- JAJA, LARVI I IMAGA BELE KUPUSNE MUŠICE (*Aleyrodes proletella*) I
- LARVI KUPUSNE I POVRTNE SOVICE (*Mamestra brassicae* i *Mamestra oleracea*).

USLOVI U KOJIMA SE ODVIJA PROIZVODNJA SU VEOMA POVOLJNI ZA RAZVOJ OVIH ŠTETNIH INSEKATA.



SLIKA 7. LARVA MALOG KUPUSARA NA NALIČJU LISTA KUPUSA



SLIKA 8. LARVA KUPUSNE SOVICE NA NALIČJU LISTA KUPUSA



SLIKA 9. JAJA, LARVE I IMAGO KUPUSNE BELE MUŠICE NA LISTU KUPUSA

PREPORUKA

PROIZVOĐAČIMA SE PREPORUČUJE PREGLED USEVA NA PRISUSTVO ŠTETOČINA. UKOLIKO SE REGISTRUJE NJHOVO PRISUSTVO, U CILJU ZAŠTITE KUPUSA, PREPORUČUJE SE PRIMENA NEKOG OD REGISTROVANIH INSEKTICIDA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	DOZA	KARENCA
MAVRIK	TAU-FLUVALINAT	0,3 L/HA	7 DANA
CORAGEN 20 SC	HLORANTRANILIPROL	0,14-0,2 L/HA	7 DANA
FASTAC ME	ALFA-CIPERMETRIN	0,3 L/HA	10 DANA
VANTEX 60 CS	GAMA-CIHALOTRIN	60-70 ML/HA	14 DANA

PRILIKOM PRIMENE PESTICIDA OBAVEZNO SE TREBA PRIDRŽAVATI UPUTSTVA ZA UPOTREBU I PROPISANIH KARENCI. KARENCA JE VREME IZRAŽENO U DANIMA KOJE TREBA DA PROTEKNE OD POSLEDNJE PRIMENE PESTICIDA DO BERBE KAKO BI PROIZVOD BIO BEZBEDAN ZA LJUDSKU UPOTREBU. KARENCA ZA OBA PREPORUČENA INSEKTICIDA IZNOSI 7 DANA.

ZBOG VISOKIH DNEVNIH TEMPERATURA VAZDUHA, PREPORUKA JE DA SE TRETMAN SPROVEDE U VEČERNJIM ČASOVIMA KADA TEMPERATURA PADNE ISPOD 25°C.

.....
POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I POŠTOVANI GLEDAOCI, DETALJNIJE
INFORMACIJE O POJAVI ŠTETNIH ORGANIZAMA I MERAMA KONTROLE MOŽETE POGLEDATI
NA SAJTU PROGNOZNO IZVEŠTAJNE SLUŽBE ZAŠTITE BILJA VOJVODINE
WWW.PISVOJVODINA.COM