

POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I DRAGI GLEDAOCI DOBRO DOŠLI U „ZELENU PROGNOZU“  
DANAS VAS INFORMIŠEMO O STANJU U USEVIMA JEČMA

---

### **FAZE RAZVOJA JEČMA**

NA PODRUČJU VOJVODINE USEVI JEČMA SE NALAZE U RAZLIČITIM FAZAMA RAZVOJA U ZAVISNOSTI OD DATUMA SETVE, LOKALITETA, SORTIMENTA I DO SADA SPROVEDENIH AGROTEHNIČKIH MERA, OD FAZE FORMIRANOG TREĆEG KOLENCA DO FAZE POJAVE ZASTAVIČARA.



SLIKA 1. FAZA RAZVOJA JEČMA

### **STANJE U USEVIMA JEČMA**

VIZUELNIM PREGLEDIMA USEVA JEČMA REGISTROVANO JE PRISUSTVO SIMPTOMA RAZLIČITIH VRSTA PEGAVOSTI: MREŽASTA PEGAVOST LISTA JEČMA, SOČIVASTA PEGAVOST LISTA JEČMA, SIMPTOMI KOJI PODSEĆAJU NA RAMULARIOZNU PEGAVOST JEČMA, KAO I SIMPTOMI PEPELNICE ŽITA.



SLIKA 2. SIMPTOMI PEGAVOSTI NA LISTU



SLIKA 3. SIMPTOMI PEGAVOSTI NA LISTU

## PREPORUKA

U USEVIMA JEČMA KOJI SU U FAZI ZASTAVIČARA, KAKO BI SE SAČUVAO PRINOS I SPREČILO DALJE ŠIRENJE PATOGENA, PROIZVOĐAČIMA SE PREPORUČUJE PREGLED NA PRISUSTVO SIMPTOMA BOLESTI. UKOLIKO SE REGISTRUJE 10% BILJAKA SA SIMPTOMIMA PEGAVOSTI PREPORUČUJE SE PRIMENA NEKOG OD REGISTROVANIH FUNGICIDA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	DOZA
ZANTARA	TEBUKONAZOL + BIKSAFEN	1 - 1,25 L/HA
OSIRIS	EPOKSIKONAZOL + METKONAZOL	1,5 - 2,5 L/HA
ANTRE PLUS	TEBUKONAZOL + TIOFANAT-METIL	1,5 L/HA
DUETT ULTRA	EPOKSIKONAZOL + TIOFANAT-METIL	0,4 - 0,6 L/HA
PROSARO 250 EC	TEBUKONAZOL + PROTIOKONAZOL	0,75 - 1 L/HA
ASCRA XPRO	BIKSAFEN+FLUOPIRAM+PROTIOKONAZOL	0,9 – 1,2 L/HA

SPROVOĐENJE HEMIJSKIH MERA ZAŠTITE SE PREPORUČUJE KADA DNEVNE TEMPERATURE PREĐU 15°C ZBOG EFIKSANIJEG DELOVANJA FUNGICIDA.

.....  
POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I POŠTOVANI GLEDAOCI, DETALJNIJE INFORMACIJE O POJAVI ŠTETNIH ORGANIZAMA I MERAMA KONTROLE MOŽETE POGLEDATI NA SAJTU PROGNOZNO IZVEŠTAJNE SLUŽBE ZAŠTITE BILJA VOJVODINE [WWW.PISVOJVODINA.COM](http://WWW.PISVOJVODINA.COM)