

POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I DRAGI GLEDAOCI DOBRO DOŠLI U „ZELENU PROGNOZU“
DANAS VAS INFORMIŠEMO O STANJU U USEVIMA KROMPIRA

.....

FAZE KROMPIRA

NA PODRUČJU VOJVODINE USEVI KROMPIRA NAMENJENI ZA JESENJU PROIZVODNJU SE NALAZE U FAZI OD DEVET I VIŠE LISTOVA RAZVIJENO, DOK SU USEVI NAMENJENI ZA RANU PROIZVODNJU U PROCESU VAĐENJA.



SLIKA 1. FAZA RAZVOJA KROMPIRA

Plamenjača krompira (*Phytophthora infestans*)

PLAMENJAČA KROMPIRA JE U NAŠIM PROIZVODNIM USLOVIMA NAJZNAČAJNIJE OBOLJENJE KROMPIRA. RAZVIJA SE NA SVIM NADZEMNIM DELOVIMA BILJAKA I KRTOLAMA. PRVI SIMPTOMI JAVLJAJU SE NA STARIJEM LIŠĆU U VIDU VODENASTIH PEGA. U POVOLJNIM USLOVIMA PEGE SE BRZO POVEĆAVAJU I DOBIJAJU MRKU BOJU BEZ JASNIH KONTURA. NA NALIČJU LISTA JAVLJA SE PREVLAKA OD KONIDIJA I KONIDIOFORA OVE GLJIVE. UBRZO CEO LIST POSTAJE ZARAŽEN I SUŠI SE. USLED JAČEG NAPADA DOLAZI DO ZARAZE SVIH NADZEMNIH DELOVA I USEV IZLGEDA KAO DA JE SPRŽEN VATROM PA OTUDA I NAZIV OVE BOLESTI PLAMENJAČA. NA ZARAŽENIM KRTOLAMA DOLAZI DO FORMIRANJA NEKROTIČNIH

PEGA. NA JAČE ZARAŽENIM KRTOLAMA, PRI POPREČNOM PRESEKU, UOČAVA SE VODENASTO TKIVO MRKE BOJE. TRULEŽ SE ŠIRI I NAKON VAĐENJA KRTOLA U SKLADIŠTU.



SLIKA 2. SIMPTOM PLAMENJAČE NA LISTU

NAJAVLJENO NESTABILNO VREME SA ČESTIM PADAVINAMA TOKOM OVE NEDELJE MOŽE STVORITI POVOLJNE USLOVE ZA INFEKCIJU USEVA KROMPIRA PLAMENJAČOM.

PREPORUKA

PROIZVOĐAČIMA KROMPIRA SE PREPORUČUJE SPROVOĐENJE PREVENTIVNOG TRETMANA PRIMENOM FUNGICIDA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	DOZA
POLYRAM DF	METIRAM	2 KG/HA

Krompirova zlatica (*Leptinotarsa decemlineata*)

U USEVIMA KROMPIRA REGISTRUJE SE PRISUSTVO KROMPIROVE ZLATICE. PRISUTNE SU ODRASLE JEDINKE, POLOŽENA JAJA NA NALIČJU LISTOVA I ISPIJENE LARVE. LARVE SVOJOM ISHRANOM MOGU UNIŠTITI VELIKU POVRŠINU LISTA ZA KRATKO VREME.



SLIKA 3. IMAGA KROMPIROVE ZLATICE



SLIKA 4. JAJA KROMPIROVE ZLATICE



SLIKA 5. LARVE KROMPIROVE ZLATICE

PREPORUKA

PREPORUČUJE SE PROIZVOĐAČIMA OBILAZAK USEVA KROMPIRA I UTVRĐIVANJE PRISUSTVA KROMPIROVE ZLATICE NA NJIMA. UKOLIKO SE REGISTRUJE PRISUSTVO LARVI PREPORUČUJE SE PRIMENA NEKOG OD REGISTROVaniH INSEKTICIDA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	DOZA
MOSPILAN 20 SG, TONUS, VOLLEY 20 SP, WIZZZAARD	ACETAMIPRID	0,2 – 0,25 KG/HA
ALVERDE	METAFLUMIZON	0,2- 0,25 L/HA

U USEVIMA KROMPIRA KOJI SU NAMENJENI ZA PROIZVODNJU MLADOG KROMPIRA NE PREPORUČUJU SE HEMIJSKE MERE ZAŠTITE.

.....
POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I POŠTOVANI GLEDAOCI, DETALJNIJE INFORMACIJE O POJAVI ŠETNIH ORGANIZAMA I MERAMA KONTROLE MOŽETE POGLEDATI NA SAJTU PROGNOZNO IZVEŠTAJNE SLUŽBE ZAŠTITE BILJA VOJVODINE
WWW.PISVOJVODINA.COM