

Zelena prognoza za 22.5.2018. - O stanju u usevima šećerne repe

FAZE ŠEĆERNE REPE

NA PODRUČJU VOJVODINE USEVI ŠEĆERNE REPE SE NALAZE U FAZI RAZVOJA LISTOVA, OD 4 DO 8 LISTOVA RAZVIJENO.



SLIKA 1. FAZA RAZVOJA ŠEĆERNE REPE

LISNE SOVICE NA ŠEĆERNOJ REPI

PREGLEDOM USEVA ŠEĆERNE REPE REGISTROVANA JE POJAVA LARVI LISNIH SOVICA I OŠTEĆENJA NA LISTOVIMA USLED NJIHOVE ISHRANE.

USLOVI U KOJIMA SE ODVIJALA PROIZVODNJA ŠEĆERNE REPE TOKOM APRILA MESECA UTICALA JE NEPOVOLJNO NA RAZVOJ BILJAKA. BILJKE ŠEĆERNE REPE SU ZAOSTALE U PORASTU I MANJEG SU HABITUSA U ODNOSU NA PRETHODNE VEGETACIJE. U OVAKVIM OKOLNOSTIMA, NEOPHODNO JE SAČUVATI LISNU MASU I BILJNI SKLOP.



SLIKA 2. LARVA LISNE SOVICE I OŠTEĆENJE BILJAKA REPE USLED ISHRANE



SLIKA 3. LARVA LISNE SOVICE I OŠTEĆENJE BILJAKA REPE USLED ISHRANE



SLIKA 4. LARVA LISNE SOVICE NA LISTU ŠEĆERNE REPE

PREPORUKA

POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA SE PREPORUČUJE OBILAZAK USEVA ŠEĆERNE REPE I PRAĆENJE PRISUSTVA LISNIH SOVICA I OŠTEĆENJA NA BILJKAMA USLED NJIHOVE ISHRANE. NA PARCELAMA NA KOJIMA SE PROCENAT OŠTEĆENE LISNE MASE PRIBLIŽAVA NIVOU OD 20 DO 25% NEOPHODNO JE ZAŠTITI USEV PRIMENOM INSEKTICIDA:

| PREPARATI | AKTIVNA MATERIJA | DOZA |
|---------------------------------------|-------------------------|------------|
| PYRINEX 48 SC, KOZMA | HLORPIRIFOS | 1-1,5 L/HA |
| NURELLE D, KONZUL, DESPOT, SAVANUR EC | HLORPIRIFOS+CIPERMETRIN | 1,5-2 L/HA |
| KARATE ZEON, KOZAK | LAMBDA-CIHALOTRIN | 0,2 L/HA |