

POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I DRAGI GLEDAOCI DOBRO DOŠLI U „ZELENU PROGNOZU“

DANAS VAS INFORMIŠEMO O STANJU U ZASADIMA JABUKA I POTREBI SPROVOĐENJA MERA ZAŠTITE

FAZE JABUKE

NA PODRUČJU VOJVODINE ZASADI JABUKA SE, U ZAVISNOSTI OD LOKALITETA I SORTIMENTA, NALAZE U RAZLIČITIM FAZAMA RAZVOJA PLODOVA, OD PLODOVI DOSTIGLI 70% KRAJNJE VELIČINE DO POČETKA ZRENJA I POJAVE KARAKTERISTIČNE BOJE PLODA ZA KULTIVAR.



SLIKA 1. FAZA RAZVOJA JABUKE

JABUKIN SMOTAVAC (*Carpocapsa pomonella*)

JABUKIN SMOTAVAC JE NAJZNAČAJNIJA ŠTETOČINA JABUKE. U NAŠIM PROIZVODNIM USLOVIMA RAZVIJA TRI DO ČETIRI GENERACIJE GODIŠNJE.

ŠTETE PRIČINJAVAJU LARVE KOJE SE UBUŠUJU U PLODOVE I ISHRANJUJU MESOM PLODA I SEMENKAMA. NAPADNUTI PLODOVI PREVREMENO OTPADAJU I GUBE TRŽIŠNU VREDNOST.

S OBZIROM DA JE PERIOD POLAGANJA JAJA I PILJENJA LARVI DRUGE GENERACIJE JABUKINOG SMOTAVCA VEOMA RAZVUČEN, U ZASADIMA JABUKA NA PODRUČJU VOJVODINE I DALJE JE U TOKU PILJENJE LARVI DRUGE GENERACIJE JABUKINOG SMOTAVCA. U VIZUELNIM PREGLEDIMA PLODOVA JABUKA REGISTRUJE SE PRISUSTVO SVIH RAZVOJNIH STADIJUMA JAJA I TEK ISPILJENE LARVE OVE ŠTETOČINE.



SLIKA 2. JAJE JABUKINOG SMOTAVCA NA PLODU JABUKE



SLIKA 3. JAJE JABUKINOG SMOTAVCA NA PLODU U FAZI „CRNA GLAVA“, NEPOSREDNO PRED PILJENJE



SLIKA 4. LARVA JABUKINOG SMOTAVCA NA PLODU

PREPORUKA

U CILJU ZAŠTITE PLODOVA JABUKE OD UBUŠIVANJA LARVI JABUKINOG SMOTAVCA PREPORUČUJE SE PRIMENA INSEKTICIDA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	KONCENTRACIJA
LAMDEX, GROM, MEGATHRIN 2,5 EC, ŠAKAL	LAMBDA-CIHALOTRIN	0,02%

PEPELNICA JABUKE (*Podosphaera leucotricha*)

U ZASADIMA JABUKA SA OSETLJIVIM SORTIMENTOM REGISTRUJE SE PRISUSTVO SIMPTOMA PEPELNICE JABUKE. USLOVI U KOJIMA SE ODVIJA PROIZVODNJA SU POVOLJNI ZA RAZVOJ OVOG PATOGENA.



SLIKA 5. SIMPTOM PEPELNICE JABUKE

PREPORUKA

U CILJU SUZBIJANJA PEPELNICE JABUKE PREPORUČUJE SE PRIMENA NEKOG OD FUNGICIDA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	DOZA/KONCENTRACIJA
KUMULUS DF, KOSSAN WG, WEBESAN, KOLOSUL	SUMPOR	3 – 5 KG/HA
AKORD, MYSTIK 250-EC	TEBUKONAZOL	0,7 L/HA
TOPAS 100-EC	PENKONAZOL	0,04%

ZBOG VISOKOH DNEVNIH TEMPERATURA SPROVOĐENJE HEMIJSKIH MERA ZAŠTITE PREPORUČUJE SE U VEČERNJIM ČASOVIMA.

.....
POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I DRAGI GLEDAOCI, DETALJNIJE INFORMACIJE O POJAVI ŠTETNIH ORGANIZAMA I MERAMA KONTROLE MOŽETE POGLEDATI NA SAJTU PROGNOZNO IZVEŠTAJNE SLUŽBE ZAŠTITE BILJA VOJVODINE WWW.PISVOJVODINA.COM