

BILJNA VRSTA: BRESKVA, NEKTARINA, KAJSIJA, ŠLJIVA, VIŠNJA, TREŠNJA

ŠTETNI ORGANIZAM: ŠUPLJIKAVOST LIŠĆA KOŠTIČAVOG VOĆA, KOVRDŽAVOST LIŠĆA BRESKVE, ROGAČ ŠLJIVE, MONILIOZA, BAKTERIOZNO IZUMIRANJE VOĆAKA

BLIŽI SE KRAJ SEZONE U VOĆARSTVU, I SADA JE PRAVO VREME DA SE POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI PRIPREME ZA NAREDNU GODINU, KAKO BI ZASADI OSTALI U ŠTO BOLJOJ KONDICIJI.

KOŠTIČAVO VOĆE SE U ZAVISNOSTI OD BILJNE VRSTE, SORTIMENTA, LOKALITETA I KONDICIJE ZASADA, NALAZI U FAZI OD POČETKA OPADANJA LIŠĆA DO 70% LIŠĆA ŽUTO I OPALO.

PRE SVEGA, U ZASADIMA TREBA PRISTUPITI OREZIVANJU I UKLANJANJU SUVIH I OBOLELIH GRANA I SAKUPLJANJU I UNIŠTAVANJU MUMIFICIRANIH PLODOVA I OPALOG LIŠĆA. SAV SAKUPLJENI BILJNI MATERIJAL TREBA IZNETI IZ VOĆNJAKA. OVO JE VEOMA ZNAČAJNO SA ASPEKTA SMANJENJA INFektivNOG POTENCIJALA PROUZROKOVAČA BOLESTI.

NAKON SPROVOĐENJA MEHANIČKIH I POMOTEHNIČKIH MERA, MOŽE SE POČETI SA JESENJIM TRETMANOM KOŠTIČAVOG VOĆA, TZV. PLAVIM PRSKANJEM, PREPARATIMA NA BAZI BAKRA. OVAJ TRETMAN JE VEOMA VAŽAN JER SMANJUJE INFektivNI POTENCIJAL MNOGIH PATOGENA REDUKUJUĆI PREZIMLJUJUĆE FORME PRISUTNE NA STABLIMA, GRANAMA I PUPOLJCIMA, ALI TAKOĐE SLUŽI I ZA DEZINFEKCIJU SAMIH STABALA.

OVU PROIZVODNU SEZONU OBELEŽILO JE ZNAČAJNO PRISUSTVO PADAVINA KOJE SU FAVORIZOVALE RAZVOJ MNOGIH GLJIVIČNIH I BAKTERIOZNIH OBOLJENJA U VOĆARSTVU, TE SU U MNOGIM ZASADIMA I PORED INTENZIVNE ZAŠTITE PRISUTNI SIMPTOMI BOLESTI: ŠUPLJIKAVOSTI LIŠĆA KOŠTIČAVOG VOĆA, MONILIOZE KOŠTIČAVOG VOĆA, PEGAVOSTI LIŠĆA VIŠNJE I TREŠNJE I DR., STOGA OVE GODINE BAKARNI TRETMAN DOBIJA NA JOŠ VEĆEM ZNAČAJU.

U ZASADIMA KAJSIJA, BRESAKA, NEKTARINA, VIŠANJA, TREŠANJA, ŠLJIVA SE PREPORUČUJE PRIMENA BAKARNIH PRAPARATA PO OPADANJU 50-70% LISNE MASE. REGISTROVANI SU SLEDEĆI PREPARATI:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJAI	DOZA	BILJNA VRSTA
BAKARNI OKSIHLORID 50	BAKAR-OKSIHLORID	0,75%	BRESKVA, ŠLJIVA, TREŠNJA, VIŠNJA, KAJSIJA
CURENOX 50 WP		1,5-2 KG/HA	BRESKVA, NEKTARINA, ŠLJIVA, TREŠNJA, VIŠNJA, KAJSIJA
GRIFON	BAKAR-OKSIHLORID + BAKAR-HIDROKSID	4 L/HA	BRESKVA, NEKTARINA, ŠLJIVA, TREŠNJA, KAJSIJA
EVEREST	BAKAR-HIDROKSID	0,6-0,8%	BRESKVA, ŠLJIVA, VIŠNJA

SPROVOĐENJE TRETMANA SE PREPORUČUJE PO MIRMOM I SUVOM VREMENU U NAJTOPLIJEM DELU DANA, UZ UTROŠAK VEĆE KOLIČINE VODE RADI ŠTO BOLJE POKRIVENOSTI BILJAKA.

DETALJNIJE INFORMACIJE O ŠTETNIM ORGANIZMIMA I MERAMA NJIHOVE KONTROLE MOŽETE POGLEDATI NA PORTALU PROGNOZNO-IZVEŠTAJNE SLUŽBE ZA ZAŠTITU BILJA AP VOJVODINE.



SLIKA 1. FAZA RAZVOJA BESKVE



SLIKA 2. FAZA RAZVOJA ŠLJIVE



SLIKA 3. FAZA RAZVOJA VIŠNJE



SLIKA 4. FAZA RAZVOJA TREŠNJE



SLIKA 5. SIMPTOMI SUŠENJA CVETOVA I GRANČICA NA ŠLJIVI (LEVO) I VIŠNJI (DESNO) U TOKU VEGETACIJE



SLIKA 6. SIMPTOMI MRKE TRULEŽI PLODOVA NA ŠLJIVI (LEVO) I VIŠNJI (DESNO) U TOKU VEGETACIJE



SLIKA 7. SIMPTOMI BAKTERIOZNOG RAKA I IZUMIRANJA VOĆAKA – NA VIŠNJI