

Zelena prognoza za 25.3.2019 - O SIVOJ REPINOJ PIPI

FAZE ŠEĆERNE REPE

NA PODRUČJU VOJVODINE USEVI ŠEĆERNE REPE KOJI SU POSEJANI U PRVOJ DEKADI MARTA SU NIKLI, DOK JE NA NEKIM PARCELAMA SETVA JOŠ UVEK U TOKU.



SLIKA 1. ŠEĆERNA REPA U FAZI KOTILEDONIH LISTOVA

SIVA REPINA PIPA (*Bothynoderes punctiventris*)

U RANIM FAZAMA NICANJA I PORASTA, USEVI ŠEĆERNE REPE SU UGROŽENI OD SIVE REPINE PIPE. GLAVNE ŠTETE PRIČINJAVA IMAGO KOJI OŠTEĆUJE STABLJIKU, KOTILEDONE I STALNO LIŠĆE REPE. MLADE BILJČICE ŠEĆERNE REPE MOGU BITI POTPUNO PREGRIŽENE. NA LIŠĆU PIPA OTKIDA RUBOVE LIŠĆA PRAVEĆI POLUMESEČASTA VEĆA ILI MANJA UDUBLJENJA. SAMO U TOKU JEDNOG DANA JEDAN ODRASLI INSEKT MOŽE OŠTETITI 5 DO 15 BILJČICA STARIH JEDAN DAN. SA PORASTOM TEMPERATURE INTENZITET ISHRANE SE POVEĆAVA. U POČETKU PRVO STRADAJU IVIČNI DELOVI PARCELE, POGOTOVO AKO SE NALAZE BLIZU STAROG REPIŠTA. KADA POČNE LET INSEKATA ŠTETE SE JAVLJAJU NA CELOJ PARCELI U VIDU MANJIH ILI VEĆIH OAZA. UKOLIKO JE VREME SUVO I TOPLO, ZA NEKOLIKO DANA MOŽE DA UNIŠTI VELIKE POVRŠINE POD REPOM.

TRENTUTNO SE NA FEROMONSKIM KLOPKAMA REGISTRUJU VISOKE BROJNOSTI REPINE PIPE.



SLIKA 2. REPINA PIPA NA FEROMONSKOJ KLOPCI



SLIKA 3. IMAGO REPINE PIPE



SLIKA 4. ISHRANA IMAGA REPINE PIPE

PREPORUKA

PREPORUČUJU SE PROIZVOĐAČIMA REDOVNI OBILASCI NOVOPOSEJANIH REPIŠTA I PRAĆENJE PRISUSTVA REPINE PIPE NA NJIMA. USEVE TREBA OBILAZITI U NAJTOPLIJEM DELU DANA KADA SU PIPE I NAJAKTIVNIJE.

UKOLIKO SE REGISTRUJE 0,1 – 0,3 ODRASLE JEDINKE SIVE REPINE PIPE PO m² NEOPHODNO JE SPROVESTI HEMIJSKE MERE ZAŠTITE PRIMENOM INSEKTICIDA.

DOK SU BILJKE U FAZI NICANJA I KOTILEDONIH LISTOVA PREPORUČUJE SE PRIMENA INSEKTICIDA KONTAKTNOG DELOVANJA KOJI SU REGISTROVANI U USEVIMA ŠEĆERNE REPE:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	DOZA
CIPKORD 20-EC, CRNA MAMBA	CIPERMETRIN	0,15 – 0,3 L/HA
TALSTAR 10 EC, FOBOS EC, BIFENUCUS	BIFENTRIN	0,2 -0,3 L/HA
KARATE ZEON, KOZAK	LAMBDA-CIHALOTRIN	0,2 L/HA