POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I DRAGI GLEDAOCI DOBRO DOŠLI U „ZELENU PROGNOZU“
DANAS VAS INFORMIŠEMO O LISNIM VAŠIMA I TRIPSIMA KAO PRENOSIOCIMA FITOPATOGENIH VIRUSA U PROIZVODNJI RASADA
.....

FAZE PARADAJZA, KRASTAVCA, PAPRIKE I KUPUSNJAČA

NA PODRUČJU VOJVODINE U TOKU JE PROIZVODNJA RASADA PARADAJZA, PAPRIKE, KRASTAVCA, KUPUSNJAČA I DRUGOG POVRĆA.

SLIKA 1. PROIZVODNJA RASADA

LISNE VAŠI I TRIPSI

LISNE VAŠI I TRIPSI SU INSEKTI KOJI SVOJOM ISHRANOM NA BILJKAMA, POREDUZROKOVANJA DIREKTNIH ŠTETA, PRENOSE VELIKI BROJ FITOPATOGENIH VIRUSA. U PROTEKLIM SEZONAMA U PROIZVODNJI PARADAJZA, PAPRIKE I KRASTAVCA REGISTROVANI SU SIMPTOMI VIROZA NA BILJKAMA. LABORATORIJSKOM ANALIZOM BOLESNIH BILJAKA POTVRĐENO JE PRISUSTVO VIRUSA BRONZAVOSTI PARADAJZA (*Tomato spotted wilt virus* – TSWV), VIRUSA MOZAIKA KRASTAVCA (*Cucumber mozaic virus* - CMV), VIRUSA CRTIČASTOG MOZAIKA KROMPIRA (*Potato virus Y* – PVY) I VIRUSA MOZAIKA LUCERKE (*Alfalfa mosaic virus* – AMV).

SLIKA 2. LISNA VAŠ

SLIKA 3. TRIPS

U CILJU PROIZVODNJE ZDRAVOG RASADA VEOMA JE VAŽNO PRAĆENJE PRISUSTVA LISNIH VAŠI I TRIPA.

LISNE VAŠI SU INSEKTI VELIČINE OD 1,5MM DO 5MM. RASPROSTRANJENE SU SVUDA I ŽIVE U KOLONIJAMA. S OBZIROM DA SE LISNE VAŠI RAZVIJAJU NA NALIČJU LISTOVA, VIZUELNI PREGLEDI NA PRISUSTVO OVIH ŠTETOČINA VRŠE SE UPRAVO NA OVIM DELOVIMA BILJAKA.

SLIKA 4. LISNE VAŠI NA NALIČJU LISTA

TRIPSI SU VEOMA SITNI INSEKTI DUŽINE OD 0,5MM DO 2MM. NALAZE SE NA SVIM NADZEMNIM DELOVIMA BILJAKA, NA KOJIMA SE HRANE SISAJUĆI SOKOVE BILJAKA. S OBZIROM NA NJIHOVU VELIČINU, NAJLAŠKI METOD ZA ODREĐIVANJE NJIHOVOG PRISUSTVA JE OTRESANJE BILJAKA NA BELU PODLOGU.

SLIKA 5. IMAGO TRIPSA NA BELOJ PODLOZI

PREPORUKA

PROIZVOĐAČIMA SE PREPORUČUJE PREGLED RASADA NA PRISUSTVO LISNIH VAŠI I TRIPSA.

UKOLIKO SE PRILIKOM PREGLEDA RASADA NA NALIČJU LISTOVA REGISTRUJE PRISUSTVO LISNIH VAŠI PREPORUČUJE SE PRIMENA NEKOG OD REGISTROVANIH INSEKTICIDA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	DOZA/KONCENTRACIJA
CONFIDOR 200 SL	IMIDAKLOPRID	5-7 ML/100M²
SIVANTO PRIME	FLUROHLORIDON	0,075%

UKOLIKO SE OTRESANJEM RASADA NA BELU PODLOGU REGISTRUJE PRISUSTVO TRIPSA PREPORUČUJE SE PRIMENA NEKOG OD INSEKTICIDA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	DOZA
LASER 240 SC	SPINOSAD	3-4 ML/100M²
EXIREL	CIJANTRANILIPROL	7,5 ML/100M²

ZA USPEŠNU KOTROLU VIROZA U PROIZVODNJI RASADA, PORED SUZBIJANJA NJIHOVIH PRENOSIOCA, POTREBNO JE PREDUZETI I SVE DRUGE PREVENTIVNE MERE KAO ŠTO SU SUZBIJANJE KOROVA U I OKO PLASTENIKA, POSTAVLJANJE INSEKATSKIH MREŽA NA ULAZNE OTVORE PLASTENIKA I UKLANJANJE BILJAKA SA SIMPTOMIMA VIROZA.

.....

POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I POŠTOVANI GLEDAOCI, DETALJNIJE INFORMACIJE O POJAVI ŠTETNIH ORGANIZAMA I MERAMA KONTROLE MOŽETE POGLEDATI NA SAJTU PROGNOZNO IZVEŠTAJNE SLUŽBE ZAŠTITE BILJA VOJVODINE WWW.PISVOJVODINA.COM