

Zelena prognoza za 27.3.2019. - O KUPUSOVOJ MUVI, VAŽNOJ ŠTETOČINI U PROIZVODNJI RANIH KUPUSNJAČA

FENOFAZE KUPUSA

NA PODRUČJU VOJVODINE U TOKU JE RASAĐIVANJE RANIH KUPUSNJAČA.

KUPUSOVA MUVA (*Delia radicum*)

U POČETNIM FAZAMA RAZVOJA, VELIKE ŠTETE NA USEVIMA KUPUSNJAČA, MOŽE PROUZROKOVATI KUPUSOVA MUVA. OVA ŠTETOČINA IMA DVE DO TRI GENERACIJE GODIŠNJE, A NAJVEĆE ŠTETE PRIČINJAVAJU LARVE PRVE GENERACIJE NA USEVIMA RANIH KUPUSNJAČA. ODRASLE JEDINKE MUVA POJAVLJUJU SE KADA JE TEMPERATURA ZEMLJIŠTA OKO 12°C I POLAŽU JAJA NA KORENOV VRAT KUPUSA ILI U ZEMLJU NEPOSREDNO OKO BILJKE. ISPIJENE LARVE SE U POČETKU HRANE KORENOVIM DLAČICAMA, A KASNIJE PRODIRU U KOREN KUPUSA I OMETAJU NORMALNO CIRKULISANJE SOKOVA. NAPADNUTE BILJKE MENJAJU BOJU I POSTAJU PLAVOLJUBIČASTE, A KADA JE NAPAD VEĆI POSTAJU BLEDE I SUŠE SE. MLADE BILJKE MOGU BITI UNIŠTENE OD SAMO JEDNE LARVE.



SLIKA 1. JAJA KUPUSOVE MUVE



SLIKA 2. LARVE KUPUSOVE MUVE NA KORENU



SLIKA 3. SUŠENJE BILJKE KUPUSA USLED ISHRANE LARVI KUPUSOVE MUVE NA KORENU



SLIKA 4. NAPADNUTA I ZDRAVA BILJKA KUPUSA

STANJE U USEVIMA KUPUSA

NA FEROMONSKIM KLOPKAMA REGISTRUJE SE ULOV ODRASLIH JEDINKI KUPUSOVE MUVE. U TOKU JE LET PRVE GENERACIJE OVE ŠTETOČINE.



SLIKA 5. ODRASLA JEDINKA KUPUSOVE MUVE NA FEROMONSKOJ KLOPCI



SLIKA 6. ODRASLA JEDINKA KUPUSOVE MUVE

PREPORUKA

S OBZIROM DA JE U TOKU LET KUPUSNE MUVE, U USEVIMA KUPUSNJAČA, ODMAH PO RASAĐIVANJU, PREPORUČUJE SE PRIMENA INSEKTICIDA U CILJU SUZBIJANJA IMAGA I SPREČAVANJA POLAGANJA JAJA. PREPORUČUJE SE PRIMENA NEKOG OD SLEDEĆIH PREPARATA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	DOZA
BIFENICUS, FOBOS-EC	BIFENTRIN	0,2-0,3 L/HA

PRILIKOM PRIMENE PESTICIDA TREBA SE PRIDRŽAVATI UPUTSTVA ZA UPOTREBU I PREDUZETI SVE MERE U CILJU ZAŠTITE OPRAŠIVAČA.