

Zelena prognoza za 27.6.2018. - O stanju i potrebi preduzimanja mera zaštite u zasadima višanja i trešanja

FAZE VIŠANJA I TREŠANJA

NA TERITORIJI VOJVODINE BERBA VIŠANJA I TREŠANJA JE ZAVRŠENA.



SLIKA 1. ZASAD VIŠNJE

PEGAVOST LIŠĆA VIŠNJE I TREŠNJE (*Blumeriella jaapii*)

PROUZROKOVAČ PEGAVOSTI LIŠĆA VIŠNJE I TREŠNJE JE NAJZNAČAJNIJI PATOGEN LISTA U PROIZVODNJI OVIH VOĆNIH VRSTA NA NAŠEM PODRUČJU. JAVLJA SE SVAKE GODINE TE JE I U OVOJ PROIZVODNOJ SEZONI ZABELEŽENO NJEGOVO PRISUSTVO U VOĆNJACIMA.



SLIKA 2. SIMPTOMI PEGAVOSTI LIŠČA NA VIŠNJI



SLIKA 3. SIMPTOMI PEGAVOSTI LIŠČA NA TREŠNJI

SIMPTOMI KOJE OVA GLJIVA PROUZROKUJE SU SITNE PURPURNE PEGE NA LICU LISTA. KOD JAČIH ZARAZA LIŠĆE POŽUTI I OPADA. USLED PREVREMENE DEFOLIJACIJE FORMIRA SE MANJE RODNIH PUPOLJAKA ZA NAREDNU GODINU, A MOŽE DOĆI I DO RETROVEGETACIJE ŠTO DOVODI DO IZNURIVANJA VOĆKE PA ONA TEŽE PODNOSI NISKE TEMPERATURE U TOKU ZIME. U VLAŽNIM USLOVIMA, SA NALIČJA LISTA U OKVIRU PEGA, FORMIRA SE BELIČASTA NAVLAKA OD KONIDIJA GLJIVE KOJE SE PUTEM KIŠA I VAZDUŠNIH STRUJA ŠIRE OD LISTA DO LISTA. TAKO SE SEKUNDARNE INFEKCIJE OD KONIDIJA PONAVLJAJU U ZASADU SVE DO JESENI. OVA GLJIVA UPRAVO I PREZIMLJAVA U OPALOM LIŠĆU PA NAREDNE SEZONE TO JE IZVOR NOVIH INFEKCIJA.

SADA, KADA JE BERBA ZAVRŠENA I DALJE POSTOJI POTREBA ZA SUZBIJANJEM PEGAVOSTI LIŠĆA VIŠNJE I TREŠNJE KAKO BI SE SAČUVALA LISNA MASA I DOBRA KONDICIJA BILJAKA.

PREPORUKA

PREPORUKA PROIZVOĐAČIMA JE DA NAKON BERBE, A PRE NAREDNIH PADAVINA, IZVRŠE TRETMAN REGISTROVANIM FUNGICIDIMA U CILJU ZAŠTITE LISNE MASE:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJ	DOZA/KONCENTRACIJA
AGRODIN 65 WP	DODIN	0,1%
MANKOGAL-80	MANKOZEB	0,2-0,25%