

POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I DRAGI GLEDAOCI DOBRO DOŠLI U „ZELENU PROGNOZU“

DANAS VAS INFORMIŠEMO O POTREBI SPROVOĐENJA JOŠ JEDNOG TRETMANA U CILJU SUZBIJANJA CIKADE *Scaphoideus titanus* U ZASADIMA VINOVE LOZE

.....

15. JUNA SMO VAS INFORMISALI O PRISUSTVU CIKADE *Scaphoideus titanus* U VINOGRADIMA I MERAMA ZA NJENO SUZBIJANJE. PREGLEDOM NALIČJA LISTOVA VINOVE LOZE I DALJE SE UOČAVA PRISUSTVO TE CIKADE TE JE SADA VAŽNO SPROVESTI JOŠ JEDAN INSEKTICIDNI TRETMAN KAKO BI ZAŠTITILI VINOVOU LOZU.

TA CIKADA JE PRENOSILAC FITOPLAZME KOJA PROUZROKUJE VEOMA DESTRUKTIVNO OBOLJENJE, ZLATASTO ŽUTILO VINOVE LOZE. NA ZARAŽENIM ČOKOTIMA DOLAZI DO PROMENE BOJE LISTA I POJAVE NEKROZE IZMEĐU GLAVNIH LISNIH NERAVA. U KASNIJIM FAZAMA LISTOVI SE SAVIJAJU PO OBODU PREMA NALIČJU. BOJA LISTOVA JE RAZLIČITA U ZAVISNOSTI OD SORTIMENTA VINOVE LOZE. KOD CRVENIH SORTI INFICIRANI LISTOVI SU TAMNOLJUBIČASTI DO SVETLOCRVENI, A KOD BELIH SORTI SVETLOŽUTI DO ZLATNOŽUTI. DUGOROČNO DOLAZI DO SUŠENJA I PROPADANJA ČOKOTA.

PREGLEDOM ZASADA VINOVE LOZE, NA NALIČJU LISTOVA, UOČENO JE PRISUSTVO LARVI CIKADE *Scaphoideus titanus*. TRENUTNO SU DOMINANTNE LARVE TREĆEG I ČETVRTOG RAZVOJNOG STUPNJA KOJU SU SPOSOBNE DA PRENESU FITOPLAZMU.

PREPORUKA

SA CILJEM SUZBIJANJA CIKADE *Scaphoideus titanus* PROIZVOĐAČIMA SE PREPORUČUJE PRIMENA NEKOG OD REGISTROVANIH INSEKTICIDA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	DOZA/KONCENTRACIJA
FURY 10 EC	ZETA-CIPERMETRIN	0,01-0,015%
SIVANTO PRIME	FLUPIRADIFURON	0,5 L/HA

SKEĆEMO PAŽNJU I MANJIM PROIZVOĐAČIMA GROŽĐA, VLASNIKA I PO NEKOLIKO ČOKOTA, DA SPROVEDU INSEKTICIDNI TRETMAN KAKO BI SE ONEMOGUĆILO ŠIRENJE FITOPLAZME I DUGOROČNO SAČUVALA PROIZVODNJA GROŽĐA U SRBIJI.

PORED SUZBIJANJA CIKADE KAO PRENOSIOCA FITOPLAZME, MERE KONTROLE ZLATOSTOG ŽUTILA SU I STALNI SANITARNI PREGLEDI ZASADA, OBAVEZNO UKLANJANJE OBOLELIH ČOKOTA, UNIŠTAVANJE DIVLJE LOZE U OKRUŽENJU PROIZVODNIH ZASADA, UNIŠTAVANJE KOROVA I UNIŠTAVANJE I KRČENJE NAPUŠTENIH ZASADA VINOVE LOZE.

U SVIM VINOGORJIMA NA PODRUČJU VOJVODINE OTPOČELO JE PILJENJE LARVI DRUGE GENERACIJE PEPELJASTOG GROŽĐANOG MOLJCA. NAVEDENI INSEKTICID NA BAZI AKTIVNE MATERIJE ZETA-CIPERMETRIN ZA SUZBIJANJE CIKADE DELOVAĆE I NA SUZBIJANJE TE ŠTETOČINE.

PORED SUZBIJANJA ŠTETOČINA TREBA NASTAVITI I SA ZAŠTITOM VINOVE LOZE OD PROUZROKOVAČA BOLESTI, A DETALJNIJE INFORMACIJE O MERAMA ZAŠTITE MOŽETE POGLEDATI NA PORTALU PROGNOZNO-IZVEŠTAJNE SLUŽBE ZAŠTITE BILJA VOJVODINE.



SLIKA 1. FAZA RAZVOJA VINOVE LOZE



SLIKA 2. LARVE CIKADE *Scaphoideus titanus*



SLIKA 3. LARVE CIKADE *Scaphoideus titanus* NA NALIČJU LISTA VINOVE LOZE



SLIKA 4. SIMPTOM ZLATASTOG ŽUTILA VONOVE LOZE



SLIKA 5. SIMPTOM ZLATASTOG ŽUTILA VONOVE LOZE



SLIKA 6. JAJE PEPELJASTOG GROŽĐANOG MOLJCA

.....
POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I DRAGI GLEDAOCI, DETALJNIJE INFORMACIJE O
POJAVI ŠTETNIH ORGANIZAMA I MERAMA KONTROLE MOŽETE POGLEDATI NA SAJTU
PROGNOZNO IZVEŠTAJNE SLUŽBE ZAŠTITE BILJA VOJVODINE WWW.PISVOJVODINA.COM