

## Zelena prognoza za 28.5.2018. - O bakterioznoj plamenjači jabučastog voća

### BAKTERIOZNA PLAMENJAČA JABUČASTOG VOĆA (*Erwinia amylovora*)

U ZASADIMA JABUČASTOG VOĆA REGISTROVANI SU SIMPTOMI BAKTERIOZNE PLAMENJAČE. SIMPTOMI SE MOGU VIDETI NA MLADARIMA KOJI SU POVIJENI I IMAJU IZGLED PASTIRSKOG ŠTAPA.

BAKTERIOZNA PLAMENJAČA JE IZUZETNO DESTRUKTIVAN PATOGEN.

U VLAŽNIM USLOVIMA SE VEOMA BRZO ŠIRI I ZA SAMO NEKOLIKO DANA MOŽE SE PROŠIRITI ZA 15 DO 30 CM. KOD MLADIH VOĆAKA MOŽE U JEDNOJ VEGETACIJI IZAZVATI POTPUNO SUŠENJE STABALA.

VLAŽNI PERIOD KOJI JE ZA NAMA POGODOVAO JE RAZVOJU OVOG PATOGENA. NAROČITO SU UGROŽENI ZASADI U KOJIMA JE U OVOJ I U PROŠLOJ VEGETACIJI REGISTROVANO PRISUSTVO BAKTERIJE.



SLIKA1-SIMPTOM BAKTERIOZNE PLAMENJAČE NA JABUCI



SLIKA2-SIMPTOM BAKTERIOZNE PLAMENJAČE NA JABUCI



SLIKA3-SIMPTOM BAKTERIOZNE PLAMENJAČE NA JABUCI



SLIKA4-SIMPTOM BAKTERIOZNE PLAMENJAČE NA KRUŠKI



SLIKA5-SIMPTOM BAKTERIOZNE PLAMENJAČE NA KRUŠKI

## PREPORUKA

PREPORUČUJE SE PROIZVOĐAČIMA JABUKA, KRUŠAKA I DUNJA OBAVEZAN OBILAZAK VOĆNJAKA I UTVRĐIVANJE PRISUSTVA SIMPTOMA BAKTERIOZNE PLAMENJAČE. UKOLIKO SE REGISTRUJE PRISUSTVO OVOG PATOGENA PREPORUČUJE SE MEHANIČKO UKLANJANJE ZARAŽENIH BILJNIH DELOVA UZ OSNOVNE HIGIJENSKE MERE:

1. FORMIRANJE DEZINFEKCIJNE BARIJERE OKO ZASADA
2. DEZINFEKCIJA ALATA, OBUĆE I ODEĆE RADNIKA
3. UKLANJANJE ZARAŽENIH BILJNIH DELOVA POTREBNO JE VRŠITI PO SUVOM VREMENU, BILJKE NE SMEJU BITI VLAŽNE
4. ODSTRANJIVANJE ZARAŽENIH DELOVA SE IZVODI BRZO UZ STALNU DEZINFEKCIJU ALATA
5. REZ PRILIKOM ODSTRANJIVANJA ZARAŽENIH DELOVA MORA BITI TAKAV DA OBUHVATI 30 CM ZDRAVOG TKIVA KOD JABUKE I 50 CM KOD KRUŠKE
6. RANE NA DRVENASTOM DELU POTREBNO JE DEZINFIKOVATI PREMAZIVANJEM SA 3% RASTVOROM BAKARNIH PREPARATA
7. ODSEČENE DELOVE NIKAKO NE BACATI NA ZEMLJU VEĆ IH STAVLJATI U PVC VREĆE ILI U PRIKOLICE OBLIŽNE FOLIJOM
8. SPALJIVANJE ZARAŽENIH BILJNIH DELOVA
9. ZARAŽENA STABLA OBELEŽITI VIDLJIVOM TRAKOM ILI BOJOM I NAKON 7 DANA PONOVO PREGLEDATI