

## Zelena prognoza za 29.3.2019. - O STANJU U ZASADIMA KOŠTIČAVOG VOĆA

### FENOFAZE KOŠTIČAVOG VOĆA

NA PODRUČJU VOJVODINE KOŠTIČAVE VOĆNE VRSTE (BRESKVA, KAJSIJA, TREŠNJA, VIŠNJA, ŠLJIVA) SE NALAZE U RAZLIČITIM FAZAMA CVETANJA.



SLIKA 1. CVETANJE ŠLJIVE



SLIKA 2. CVETANJE BRESKVE



SLIKA 3. CVET TREŠNJE

## SUŠENJE CVETOVA I GRANČICA I TRULEŽ PLODOVA KOŠTIČAVOG VOĆA (*Monilia laxa*)

U PERIODU CVETANJA KOŠTIČAVOG VOĆA MOŽE DOĆI DO INFEKCIJE CVETA GLJIVOM KOJA PROUZROKUJE SUŠENJE CVETOVA I GRANČICA (*Monilia laxa*). OVA GLJIVA POZNATA JE JOŠ POD NAZIVOM MONILIOZA KOŠTIČAVOG VOĆA, A PORED ŠTETA NA CVETOVIMA I GRANAMA PROUZROKUJE I TRULEŽ PLODOVA. PREZIMI U OBLIKU MICELIJE U RAK RANAMA U KORI ZARAŽENIH GRANA I U MUMIFICIRANIM PLODOVIMA NA KROŠNJI ILI NA POVRŠINI ZEMLJIŠTA. U VLAŽNIM USLOVIMA MICELIJA SPORULIŠE A KONIDIJE SE RAZNOSE VETROM, VODOM ILI INSEKTIMA. INFEKCIJA CVETA SE OSTVARUJE PREKO ŽIGA TUČKA, A POVOLJNI USLOVI ZA OSTVARENJE INFEKCIJE I BRZU POJAVU BOLESTI SU PRISUSTVO PADAVINA ILI VISOKA RELATIVNA VLAŽNOST VAZDUHA (85%) I TEMPERATURA OKO 20°C. UKOLIKO JE VEĆ OSTVARENA INFEKCIJA NEMOGUĆE JE SPREČITI RAZVOJ SIMPTOMA PRIMENOM FUNGICIDA, TE JE NEOPHODNO SPOROVESTI PREVENTIVNE MERE ZAŠTITE.

U PREDHODNA DVA DANA NA AUTOMATSKIM METEORLOŠKIM STANICAMA KOJE SU POSTAVLJENE U ZASADE VOĆA, TOKOM NOĆI I JUTRA, REGISTROVANE SU TEMPERATURE I DO -5°C. U TAKVIM USLOVIMA MOŽE DOĆI DO IZMRZAVANJA CVETOVA. MEĐUTIM, CVETOVE KOŠTIČAVOG VOĆA KOJI SU ZDRAVI POTREBNO JE ZAŠTITI.

### PREPORUKA

U TOKU SLEDEĆE NEDELJE NAJAVLJUJU SE PADAVINE KOJE MOGU DOVESTI DO INFEKCIJE CVETOVA PROUZROKOVAČEM SUŠENJA CVETOVA I GRANČICA KOŠTIČAVOG VOĆA. PRATITI PROGNOZU VREMENA I U SLUČAJU NAJAVE PADAVINA ZA DATI LOKALITET, SPROVESTI PREVENTIVNE MERE ZAŠTITE REGISTROVANIM FUNGICIDIMA.

PRILIKOM PRIMENE FUNGICIDA PRIDRŽAVATI SE UPUTSTVA ZA UPOTREBU. ZBOG PRISUSTVA PČELA I DRUGIH POLINATORA NA CVETOVIMA, PREPORUČUJU SE TRETMANI U VEČERNJIM SATIMA.

### BRESKVA

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	DOZA/KONCENTRACIJA
CIPRODEX	CIPRODINIL	0,05%
DUOFEN	TIOFANAT-METIL	1,5 L/HA
AKORD	TEBUKONAZOL	0,75 L/HA
OCTAVE	PROHLORAZ	0,04%
SIGNUM	BOSKALID+PIRAKLOSTROBIN	0,56-0,75 KG/HA

### KAJSIJA

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	DOZA/KONCENTRACIJA
OCTAVE	PROHLORAZ	0,04%

**TREŠNJA**

<b>PREPARAT</b>	<b>AKTIVNA MATERIJA</b>	<b>DOZA/KONCENTRACIJA</b>
OCTAVE	PROHLORAZ	<b>0,04%</b>

**VIŠNJA**

<b>PREPARAT</b>	<b>AKTIVNA MATERIJA</b>	<b>DOZA/KONCENTRACIJA</b>
CIPRODEX	CIPRODINIL	<b>0,05%</b>
GALOFUNGIN	KARBENDAZIM	<b>0,05%</b>
OCTAVE	PROHLORAZ	<b>0,04%</b>
SIGNUM	BOSKALID+PIRAKLOSTROBIN	<b>0,56-0,75 KG/HA</b>

**ŠLJIVA**

<b>PREPARAT</b>	<b>AKTIVNA MATERIJA</b>	<b>DOZA/KONCENTRACIJA</b>
OCTAVE	PROHLORAZ	<b>0,04%</b>
CIPRODEX	CIPRODINIL	<b>0,05%</b>
AKORD	TEBUKONAZOL	<b>0,75 L/HA</b>