

POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I DRAGI GLEDAOCI DOBRO DOŠLI U „ZELENU PROGNOZU“

DANAS VAS INFORMIŠEMO O KROMPIROVOM MOLJCU I MERAMA KONTROLE OVE ŠTETOČINE KOJE JE NEOPHODNO PREDUZETI U OVOM PERIODU

.....

FAZE KROMPIRA

NA PODRUČJU VOJVODINE, USEVI KROMPIRA SE NALAZE U RAZLIČITIM FAZAMA RAZVOJA, U ZAVISNOSTI OD LOKALITETA, DATUMA SETVE I SORTIMENTA. NA NEKIM PARCELAMA JE VEĆ POVAĐEN KROMPIR, NA NEKIM JE U TOKU VAĐENJE, A NA ZNAČAJNOM BROJU PARCELA JE KROMPIR JOŠ UVEK U FAZI OD POČETKA ŽUĆENJA CIME DO CIMA SASVIM SUVA.



SLIKA 1. FAZA RAZVOJA KROMPIRA

KROMPIROV MOLJAC (*Phthorimaea operculella*)

NA NAŠEM PROIZVODNOM PODRUČJU, USLED KLIMATSKIH PROMENA I PORASTA TEMPERATURA, KROMPIROV MOLJAC JE POSTAO VEOMA ZNAČAJNA ŠTETOČINA KROMPIRA U POSLEDNJIH NEKOLIKO GODINA.

ŽENKA KROMPIROVOG MOLJCA POLAŽE JAJA NA ZEMLJU OKO BILJAKA ILI PROLAZEĆI KROZ PUKOTINE U ZEMLJIŠTU MOŽE DA POLOŽI JAJA I NA SAMU KRTOLU. ŠTETE PRIČINJAVAJU LARVE KOJE SE UBUŠUJU U KRTOLE U KOJIMA PRAVE HODNIKE ISPOD POKOŽICE. TAKVE

KRTOLE PODLOŽNE SU NAPADU PATOGENA, GUBE TRŽIŠNU VREDNOST I VRLO BRZO PROPADAJU.

U NAŠIM AGROEKOLOŠKIM USLOVIMA OVA ŠTETOČINA MOŽE DA RAZVIJE 5 GENERACIJA U POLJU, A AKO SE UNESE U SKLADIŠTE BEZ REGULISANE TEMPERATURE MOŽE RAZVITI JOŠ 2 DO 3 GENERACIJE.



SLIKA 2. JAJA I LARVE KROMPIROVOG MOLJCA NA KRTOLAMA



SLIKA 3. LARVA KROMPIROVOG MOLJCA NA KRTOLI



SLIKA 4. ŠTETE NA KRTOLAMA OD KROMPIROVOG MOLJCA



SLIKA 5. ŠTETE NA KRTOLAMA OD KROMPIROVOG MOLJCA



SLIKA 6. ŠTETE OD KROMPIROVOG MOLJCA NA KRTOLI

NA PODRUČJU VOJVODINE, NA FEROMONSKIM KLOPKAMA SE REGISTRUJU POVEĆANI ULOVI ODRASLIH JEDINKI U POSLEDNJIH NEDELJU DANA. MAKSIMUM LETA LEPTIRA TREĆE GENERACIJE KROMPIROVOG MOLJCA SE OČEKUJE POČETKOM SLEDEĆE NEDELJE. ULAZIMO U KRITIČAN PERIOD ZA ZAŠTITU KROMPIRA OD KROMPIROVOG MOLJCA,



SLIKA 7. FEROMONSKA KLOPKA ZA KROMPIROVOG MOLJCA



SLIKA 8. ODRASLE JEDINKE KROMPIROVOG MOLJCA (ULOV NA FEROMONSKIM KLOPKAMA)

TE SE PROIZVOĐAČIMA PREPORUČUJU SLEDEĆE MERE:

- KOD USEVA GDE JE CIMA SUVA I ZEMLJIŠTE BEZ KOROVA, OBAVEZNO TREBA VADITI KROMPIR I ČUVATI GA U SKLADIŠTIMA U KOJIMA JE KONTROLISANA TEMPERATURA (ISPOD 10°C). SKLADIŠTA KROMPIRA TREBA NA SVIM OTVORIMA DA BUDU OBEZBEĐENA GUSTIM MREŽAMA KAKO BI SE SPREČIO ULAZAK ODRASLIH JEDINKI I DALJI RAZVOJ MOLJCA.
- KRTOLE KROMPIRA NAKON VAĐENJA NE TREBA OSTAVLJATI NA PARCELAMA I U DVORIŠTIMA VEĆ ŠTO BRŽE UNOSITI U SKLADIŠTA KOJA SU DOBRO OBEZBEĐENA. SVAKO IZLAGANJE KRTOLA U SPOLJNOJ SREDINI PREDSTAVLJA VISOK RIZIK PO POLAGANJE JAJA I NASTANAK ŠTETA.

- NA USEVIMA GDE CIMA JOŠ UVEK NIJE PROPALA PREPORUČUJE SE STALNO ODRŽAVANJE KOMPAKTNOSTI ZEMLJIŠTA NAVODNJAVANJEM KAKO BI SE SPREČILO STVARANJE PUKOTINA NA ZEMLJIŠTU I PROLAZAK ŽENKI DO KRTOLA GDE ĆE POLOŽITI JAJA.
- NA PARCELAMA GDE SE KROMPIR NECE USKORO VADITI, PREPORUČUJE SE PRIMENA HEMIJSKIH MERA ZASTITE SLEDEĆOM KOMBINACIJOM INSEKTICIDA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	DOZA	KARENCA U DANIMA
CORAGEN 20 SC	Hlorantraniliprol	0,15 - 0,2 L/HA	14
+	+	+	
DECIS 2,5 EC	Deltametrin	0,3-0,5 L/HA	7

.....

POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I DRAGI GLEDAOCI, DETALJNIJE INFORMACIJE O POJAVI ŠTETNIH ORGANIZAMA I MERAMA KONTROLE MOŽETE POGLEDATI NA SAJTU PROGNOZNO IZVEŠTAJNE SLUŽBE ZAŠTITE BILJA VOJVODINE WWW.PISVOJVODINA.COM