

## Zelena prognoza za 30.8.2018. - O stanju u usevima šećerne repe

### FAZE ŠEĆERNE REPE

NA PODRUČJU VOJVODINE USEVI ŠEĆERNE REPE SE NALAZE U FAZI RAZVIĆA KORENA.



SLIKA 1. USEV ŠEĆERNE REPE

### PEGAVOST LISTA ŠEĆERNE REPE (*Cercospora beticola*)

PEGAVOST LISTA ŠEĆERNE REPE JAVLJA SE SVAKE GODINE NA NAŠEM PROIZVODNOM PODRUČJU I UTIČE NA PRINOS KORENA I SADRŽAJ ŠEĆERA.

U BORBI PROTIV OVE BOLESTI NAJŠIRE SU UKLJUČENE HEMIJSKE MERE ZAŠTITE. TAKOĐE, ZNAČAJNU ULOGU U RAZVOJU BOLESTI IMA SORTIMET KAO I USLOVI U KOJIMA SE ODVIJA PROIZVODNJA REPE.

U USLOVIMA POVOLJNIM ZA RAZVOJ I ŠIRENJE PEGAVOSTI LISTA ŠEĆERNE REPE SE MOŽE DESITI DA DOĐE DO GUBLJENJA LISNE POVRŠINE ŠTO ĆE IZAZVATI PROCESSE RETROVEGETACIJE, ISCRPLJIVANJE BILJAKA I GUBITKE I U PRINOSU I U SADRŽAJU ŠEĆERA.



SLIKA 2. SIMPTOM PEGAVOSTI LISTA ŠEĆERNE REPE



SLIKA 3. SIMPTOM PEGAVOSTI LISTA ŠEĆERNE REPE

U OVOM PERIODU, OD KRAJA AVGUSTA I TOKOM SEPTEMBRA MESECA U KOJIMA DOLAZI DO PADA NOĆNIH TEMPERATURA, OMOGUĆAVA SE SINTEZA ŠEĆERA U KORENU BILJAKA TE SE NIKAKO NE SME DOPUSTITI ŠIRENJE BOLESTI I GUBLJENJE LISNE POVRŠINE. UKOLIKO DOĐE DO PROPADANJA LISNE MASE MOŽE DOĆI DO RETROVEGETACIJE, ISCRPLJIVANJA BILJAKA I GUBITKA I U PRINOSU I U SADRŽAJU ŠEĆERA.

#### **PREPORUKA**

U USEVIMA ŠEĆERNE REPE KOJI SE NEĆE VADITI U NAREDNE TRI NEDELJE PREPORUČUJU SE HEMIJSKE MERE ZAŠTITE KOMBINACIJOM FUNGICIDA KONTAKTNOG I SISTEMIČNOG DELOVANJA:

<b>PREPARAT</b>	<b>AKTIVNA MATERIJA</b>	<b>DOZA</b>
BRAVO 720 SC, DAKOFLO 720 SC, BALEAR 720 SC	HLOTOTALONIL	1,5 L/HA
+		
RIAS 300 EC, CERKOHEM	DIFENOKONAZOL + PROPIKONAZOL	0,3 L/HA